KULLANIM KILAVUZU

# ROWATINEX® KAPSÜL

## BİRİM FORMÜLÜ

1 yumuşak jelatin kapsül, etken maddeler olarak Pinen (α+β) 31 mg, Kamfen 15 mg, Sineol 3 mg, Fenkon 4 mg, Borneol 10 mg, Anetol 4 mg içerir.
Yardımcı madde olarak tıbbi düzey zeytinyağı mevcuttur.

## TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Rowatinex®, renal ve idrar yolları taşlarının çözünmesine ve atılımına yardımcı bir üründür. Üriner sistemde güçlü antispazmodik etkiye sahiptir.

Rowatinex®'in etken maddeleri olan terpenler vücutta glukronidlere metabolize olduktan sonra idrar ile atılırken üriner sistemde kalsiyum ve tuzlarının çözünürlüğünü artırırlar. Rowatinex®, spazmolitik etkiye de sahip olup, taşların idrar yollarından geçmesini kolaylaştırır, taşın atılmasına yardımcı olur.

Biyoyararlanım çalışmaları hızlı absorbsiyon göstermektedir.
Absorbsiyon yarılanma ömrü : 0.373 ± 0.08 saat
Pik plazma konsantrasyonu : 2.467 ± 0.663 mg/L
Eliminasyon yarılanma ömrü : 0.861± 0.148 saat

## ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Üriner sistem taşları ile ilgili üriner sistem spazmlarının ve inflamasyonun tedavisine yardımcıdır.

## KULLANIM ŞEKLİ

Oral yolla uygulanır.
**Yetişkinler için:** Hekim tarafından farklı şekilde önerilmedi ise klasik doz, günde üç kez, yemeklerden önce 1-2 kapsüldür.
**Çocuklar 6-14 yaş**: Hekim tarafından farklı şekilde önerilmedi ise klasik doz, günde iki kez, yemeklerden önce bir kapsüldür.

## KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

İçeriklerden herhangi birine bilinen hipersensitivite durumunda kullanılmamalıdır.

## UYARILAR VE ÖNLEMLER

Üriner sistem enfeksiyonu olan hastalarda, üriner sistem enfeksiyonunun uygun ilaçlarla tedavisi gerekir.
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz bir ilaç varsa muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
Hamilelik veya hamilelik şüphesi durumlarında kullanılması önerilmemektedir.

## HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM

Bugüne kadar Rowatinex® kullanımına ilişkin teratojenik ve embriyotoksik etki veya belirtiye ait bir bilgi bulunmamasına rağmen hamilelerde ve emziren hanımlarda yapılmış

kontrollü çalışma sonuçları bulunmamaktadır. Bu nedenle bütün ilaçlarda olduğu gibi hamilelerde ve emziren hanımlarda kullanımı önerilmemektedir.
**İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.**

## İSTENMEYEN ETKİLER
Hastaların çok az bölümünde geçici ve hafif mide rahatsızlığı bildirilmiştir. Kusma seyrek olarak bildirilmiştir. Yan etkileri seyrek ve hafiftir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORA DANIŞINIZ.

## İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Karaciğerde metabolize olduğu bilenen anti-koagülanlar veya diğer ilaçları kullanan hastalarda, özellikle bu ilaçlar kritik dozda uygulanıyorsa, dikkatli olunmalıdır.

## SAKLAMA KOŞULLARI
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'ın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

## TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Her biri 10 yumuşak jelatin kapsül içeren 10'lu blisterler halinde, 50 ve 100 kapsüllük kutularda.

## İZİN SAHİBİ
ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.
Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad.
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL

## ÜRETİM YERİ
ROWA Pharmaceuticals, İrlanda

**İZİN TARİH VE NO:** 09.11.2006, 2006/76

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.**