

## KULLANMA TALİMATI

### SILODYX® 4 mg Kapsül

Ağız yolundan uygulanır.

**Etkin madde:** Silodosin 4.0 mg

**Yardımcı maddeler:** Prejelatinize mısır nişastası, Mannitol (E421), Magnezyum stearat, Sodyum lauril sülfat, Jelatin, Titanyum dioksit (E171), Sarı demir oksit (E172)

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. SILODYX nedir ve ne için kullanılır?**
- 2 SILODYX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. SILODYX nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. SILODYX'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## 1. SILODYX nedir ve ne için kullanılır?

SILODYX alfa<sub>1A</sub> adrenoseptör blokörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna girer.

SILODYX prostatta, idrar torbasında, idrar yollarında bulunan reseptörler için seçicidir ve bu reseptörleri bloke ederek bu dokulardaki düz kasların gevşemesine neden olur. Bu da idrara çıkmanızı kolaylaştırır ve semptomlarınızı hafifletir.

SILODYX erkek hastalarda prostatın selim büyümesine (prostatik hiperplazi) bağlı gelişen üriner semptomları tedavi etmek için kullanılır, örneğin

- İdrar yapmaya başlamada zorluk,
- İdrar torbasını tamamen boşaltamama hissi,
- Geceleri de dahil olmak üzere idrar yapmaya daha sık ihtiyaç duymak.

## 2. SILODYX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### SILODYX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

- Silodosine ya da SILODYX'in içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa

SILODYX'i kullanmayınız.

### SILODYX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

- Göz merceğinizin bulanıklığından dolayı göz ameliyatı (katarakt ameliyatı) olacaksanız, göz doktorunuzu hala SILODYX kullandığınız ya da önceden kullandığınızla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Çünkü bu tip ilaçla tedavi olan bazı hastalar ameliyat sırasında iriste (gözün renkli yuvarlak kısmı) kas tonusu kaybı yaşamışlardır. Doktorunuz kullanılan ilaçlara ve ameliyat tekniklerine ilişkin uygun önlemleri alabilir. Katarakt ameliyatı olacaksanız, doktorunuza SILODYX almayı erteleyip ertelemeyeceğinizi ya da geçici bir süre için durdurup durdurmayacağınızı sorunuz.
- Aniden ayağa kalktığınızda bayılırsanız ya da başınız dönerse SILODYX almadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Özellikle tedaviye yeni başladıysanız veya kan basıncını düşürecek başka ilaçlar kullanıyorsanız, SILODYX aldıktan sonra ayağa kalktığınızda baş dönmesi ve zaman zaman bayılma meydana gelebilir. Eğer bu meydana gelirse belirtiler kaybolana kadar derhal oturunuz ya da uzanınız en kısa zamanda doktorunuzu bilgilendiriniz ('Araç ve makine kullanımı' bölümüne bakınız).
- Ciddi karaciğer problemlerinizi varsa SILODYX kullanmayınız (bu durumda SILODYX kullanımı ile ilgili bir araştırma yapılmadığı için).

- B breklerinize ilgili problemleriniz varsa l tfen doktorunuza danıřınız. Eęer orta derece b brek yetmezlięiniz varsa, doktorunuz dikkatle ve muhtemelen d ř k dozla tedavinize bařlayacaktır (b l m 3'e bakınız). Eęer ciddi b brek yetmezlięiniz varsa, SILODYX kullanmamalısınız.
- Prostatın selim b y mesi ve prostat kanseri aynı belirtileri g sterdięinden, SILODYX'le tedaviye bařlamadan doktorunuz sizi prostat kanseri iin muayene edecektir. SILODYX prostat kanserini tedavi etmez.
- SILODYX ile tedavi, erkek  remesini geici olarak etkileyebilen normal dıřı ejak lasyona (cinsel birleřme sırasında oluřan sperm miktarında azalma) neden olabilir.
- SILODYX'in 18 yařın altındaki ocuklarda kullanımı iin uygun bir endikasyonu bulunmadıęından, 18 yařın altındaki ocuklarda kullanımı  nerilmemektedir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir d nemde dahi olsa, sizin iin geerliyse, l tfen doktorunuza danıřınız.

### **SILODYX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

SILODYX'i her zaman yemeklerle birlikte kullanmalısınız (b l m 3'e bakınız).

### **Hamilelik ve emzirme**

*İlacı kullanmadan  nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eęer ocuk sahibi olmayı planlıyorsanız l tfen doktorunuzu bilgilendiriniz  nk  SILODYX'le tedavi cinsel birleřme sırasında ıkan sperm miktarında azalmaya sebep olabilir. Bu durum normal cinsel fonksiyonları etkilemez ve SILODYX kullanımı bırakıldıktan sonra kaybolur.

Prostatın selim b y mesi yalnızca erkeklerde olduęundan kadınlarda SILODYX kullanımı gerekli deęildir.

### **Ara ve makine kullanımı**

Eęer SILODYX kullanırken halsizlik, bař d nmesi, uyku hali hissediyor ya da bulanık g r yorsanız ara ve makine kullanmayınız.

### **SILODYX'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında  nemli bilgiler**

SILODYX her dozunda 132,4 mg mannitol ierir. Mannitol n hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Bu tıbbi  r n her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında 'sodyum iermez'.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

- Kan basıncını düşüren ilaçlar (özellikle alfa1- blokörler olarak adlandırılan ilaçlar örneğin prazosin, doksazosin) çünkü SILODYX alırken bu ilaçların etkisinde artış riski vardır.
- Antifungal ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol gibi), HIV-AIDS için kullanılan ilaçlar (ritonavir gibi) veya organ reddini önlemek için transplantasyondan sonra kullanılan ilaçlar (siklosporin gibi), çünkü bu ilaçlar SILODYX'in kan konsantrasyonunu arttırabilir.
- Ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeki problemlerin tedavisi için kullanılan ilaçlar (sildenafil veya tadalafil gibi), çünkü bu ilaçların SILODYX ile birlikte kullanımı kan basıncında hafif bir düşüğe neden olabilir.
- Epilepsi için kullanılan ilaçlar veya rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç), çünkü SILODYX'in etkisi azalabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. SILODYX nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

SILODYX'i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanım dozu ağız yoluyla günde 1 kapsül SILODYX 8 mg'dır.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

SILODYX yiyecekle ve tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır. Kapsül kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak tercihen bir bardak suyla yutulmalıdır.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek Yetmezliği:**

Eğer orta derecede böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için uygun bir doz ayarlaması yapacaktır. Bu amaçla SILODYX 4 mg kapsül kullanılabilir.

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla SILODYX kullandıysanız:**

*SILODYX'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Başınız dönerse ya da güçsüz hissederseniz, doktorunuzu derhal bilgilendiriniz.

**SILODYX kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, aynı gün içinde sonradan alabilirsiniz. Eğer sonraki dozun zamanı gelmişse unuttuğunuz dozu almayınız.

**SILODYX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

SILODYX kullanmayı bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

Eğer ilacın kullanımıyla ilgili başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, SILODYX herkeste olmamasına rağmen yan etkilere sebep olabilir.

En yaygın yan etki cinsel birleşme sırasında oluşan sperm miktarında azalmadır. Bu etki SILODYX kullanımı bırakıldıktan sonra ortadan kalkar. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuzu bilgilendirin.

Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi dahil) ve nadiren bayılma meydana gelebilir. Eğer güçsüzlük ya da baş dönmesi hissederseniz belirtiler ortadan kalkana kadar derhal oturun ya da uzanın. Ayağa kalktığınızda baş dönmesi veya bayılma meydana gelirse lütfen en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.

SILODYX katarakt ameliyatı (göz merceğinin bulanıklığından dolayı yapılan göz ameliyatı, 'SILODYX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ' bölümüne bakınız) sırasında komplikasyonlara neden olabilir. Göz doktorunuzu SILODYX kullandığınız ya da geçmişte kullanmış olduğunuzla ilgili derhal bilgilendirmeniz önemlidir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, SILODYX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SILODYX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Normal dışı ejakülasyon (cinsel birleşme sırasında meydana gelen az ya da fark edilemeyen spermle sonuçlanır, 'SILODYX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ' bölümüne bakınız)
- Baş dönmesi (ayağa kalkarken meydana gelen baş dönmesi de dahil, bu bölümde yukarıya bakınız)
- Akan ya da tıkalı burun
- Diyare
- Cinsel istekte azalma
- Mide bulantısı
- Ağız kuruluğu
- Ereksiyon oluşmasında ve sürdürülmesinde zorluklar
- Katarakt ameliyatı sırasında gevşek gözbebeği (bu bölümde yukarıya bakınız)
- Bayılma

Bunlar SILODYX'in hafif yan etkileridir.

Eğer cinsel hayatınızın etkilendiğini hissediyorsanız lütfen doktorunuza söyleyin.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

## **5. SILODYX'in saklanması**

*SILODYX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C' nin altında saklayınız.*

*Işık ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutusunda ve blisterde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SILODYX'i kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SILODYX'i kullanmayınız.*

## ***Ruhsat Sahibi:***

Recofarma İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. Ltd.

Doğan Araslı Cad. No: 219 Kat:2 Oda:219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

**Üretici:**

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.  
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 01/12/2010 tarihinde onaylanmıştır.*