

## KULLANMA TALİMATI

### BUTİROL FORT 22.5 mg/5 ml şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 ml şurup 22.5 mg butamirat sitrat içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sorbitol (% 70'lik kristalize olmayan), sodyum benzoat, ahududu aroması (FM00192), gliserol, sukraloz, fruktoz, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, tutti frutti aroması (FM04706), azorubin (carmoisine), saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **BUTİROL FORT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUTİROL FORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUTİROL FORT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUTİROL FORT'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. BUTİROL FORT nedir ve ne için kullanılır?**

- BUTİROL FORT, PE vistop kapağı olan 100 ml'lik Tip II amber renkli cam şişede, 5 ml ölçü kaşığı ile birlikte sunulan, açık pembe renkli, berrak, meyve aromalı çözeltilidir.
- BUTİROL FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

- BUTİROL FORT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- BUTİROL FORT çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

## **2. BUTİROL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BUTİROL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat sitrata veya BUTİROL FORT’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/allerjisi var ise kullanmayınız.

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise BUTİROL FORT’u kullanmayınız.

### **BUTİROL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUTİROL FORT’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **BUTİROL FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bildirilmemiştir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamile iseniz, ilk üç ay BUTİROL FORT kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse BUTİROL FORT kullanabilirsiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bebeğinizi emziriyorsanız, BUTİROL FORT almadan önce doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

SINECOD uyukulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğler işleri yaparken dikkatli olunuz.

### **BUTİROL FORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

BUTİROL FORT, yardımcı madde olarak sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduđu söylenmişse BUTİROL FORT'u almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Eğer, BUTİROL FORT'u günde 4 defa 5 ml olacak şekilde kullanmanız gerekiyorsa, BUTİROL FORT, içerdiği sorbitol nedeniyle hafif laksatif etki gösterebilir. Kalorifik değeri 26 kcal/g sorbitoldür.

BUTİROL FORT, tatlandırıcı olarak ayrıca sükraloz ve fruktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduđu söylenmişse, bu ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUTİROL FORT, 5 ml'lik dozunda 10 g'dan az gliserol içerir. Bu dozda gliserole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 5 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

BUTİROL FORT, sodyum benzoat içermektedir. Fakat kullanım şekli nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

BUTİROL FORT, boyar madde olarak azorubin içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

### **Diğler ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BUTİROL FORT nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 2 defa 5 ml

12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 5 ml

Yetişkinlerde : Günde 4 defa 5 ml

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTİROL FORT'u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- BUTİROL FORT ağız yoluyla kullanılır.
- İlacınızın dozunu ayarlamak için ölçülü kaşığı kullanınız. Ölçülü kaşığı her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

BUTİROL FORT'un, 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

BUTİROL FORT'un yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

##### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

BUTİROL FORT'un böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

*Eğer BUTİROL FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTİROL FORT kullandıysanız**

Aşırı dozda BUTİROL FORT alınması halinde su belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince

ortadan kalkabilir. Eđer ila kesildiđinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danıřınız.

*BUTİROL FORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.*

**BUTİROL FORT'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

**BUTİROL FORT ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler**

Bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilalar gibi BUTİROL FORT'un ieriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

**Ařađıdakilerden biri olursa, BUTİROL FORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bۆlümüne bařvurunuz:**

- Ciltte dۆküntü

Bu ok ciddi bir yan etkidir.

Eđer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin BUTİROL FORT'a karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mۆdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ok ciddi yan etki olduka seyrek gۆrölür.

**Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sۆleyiniz:**

- Uyku hali
- Bulantı
- İshal

Bunlar BUTİROL FORT'un hafif yan etkileridir.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. BUTİROL FORT’un saklanması**

*BUTİROL FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTİROL FORT’u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *BUTİROL FORT’u* kullanmayınız.

***Ruhsat Sahibi:*** Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Oğuzlar Mah. 1370. sok. No:7/3  
06520 Balgat - ANKARA

***Üretim yeri:*** Drogan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Esenboğa Merkez Mah. Çubuk Cad. No:31  
06760 Çubuk - ANKARA

Bu kullanma talimatı ..../... tarihinde onaylanmıştır.