

KULLANMA TALİMATI

CARBOMİX 50 g Oral Süspansiyon İçin Granül

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Aktif karbon 50 g
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zankı içerir.

Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız .Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkasına vermeyiniz*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. CARBOMİX nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. CARBOMİX'i kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?**
- 3. CARBOMİX nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkileri nedir?**
- 5. CARBOMİX'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1.CARBOMİX nedir ve ne için kullanılır?

CARBOMİX zehirlenmelerde antidot olarak kullanılan maddeler grubundandır.

CARBOMİX 500 mL'lik HDPE şişede (özel plastik şişe) ve özel uygulama aplikatörü ile sunulan oral süspansiyon şeklinde kullanılan granül formunda bir antidottur.

CARBOMİX etkin madde olarak aktif karbon içerir.

Akut oral zehirlenmelerde ve ilaçların yüksek dozda kullanımlarında zehirli maddelerin anında mideden absorbe edilerek (tutularak) vücuttan uzaklaştırılması için kullanılır.

2. CARBOMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARBOMİX'i ařağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eęer;

Aktif karbona veya sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zammına karřı alerjiniz var ise kullanmayınız

Bir yařından küçük çocuklarda kullanmayınız.

CARBOMİX'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CARBOMİX'i tercihen bir doktor gözetiminde kullanınız.

- Bilinci kapalı hastalara iirilmemelidir. Bu durumda mide veya mide-burun sondası yardımıyla uzman gözetiminde uygulanmalıdır.
- Bilinen bir kullanılmama durumu yoktur, her toksik madde için aynı derecede etkili bir absorban olmayabilir. Demir tuzları, siyanürler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.
- Hamilelięinizin ilk üç ayında doktorunuza danıřmadan kullanmayınız.
- Korozif (aşındırıcı) madde aldıysanız özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon korozif maddenin yol açtığı yemek borusu ve mide hasarlarının endoskopi ile görüntülenmesini engelleyebilir.
- Belirli sıvı ya da elektrolit düzensizlięiniz varsa CARBOMİX ile birlikte müshil kullanmanız tavsiye edilmez.
- Zehirlenmeye sebep olan maddenin mide baęırsak hareketleri üzerine durdurucu ya da yavaşlatıcı etkisi varsa CARBOMİX kullanıldığında sindirim kanalında tıkanma meydana gelebilir. Bu durumda mide baęırsak sesleri özellikle tekrarlı doz CARBOMİX tedavisi gören hastalarda sık ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsan sizin için geerli ise lütfen doktorunuza danıřınız.

CARBOMİX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

Aktif karbon byk oranda ilaları ve gıdaları adsorbe etmektedir. Bu nedenle CARBOMİX kullanırken iki saat ierisinde ila, gıda gibi benzeri maddelerin veya bitkisel rnlerin alınmaması veya bunların alınmasından iki saat sonrasına kadar ilacın kullanılmaması gerekmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CARBOMİX doktor tarafından gerekli grlmedike hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CARBOMİX anne st ile atılmamaktadır, emzirme dneminde kullanılabilir.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanım becerisi zerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

CARBOMİX kullanımı genellikle oral olarak kullanılan ilaların etkisini azaltır. Aktif karbon kullanımı oral kontraseptif ve steroidlerin etkisini azaltabilir.

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CARBOMİX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıėı iin talimatlar:

CARBOMİX yetiřkinlerde mmkn olan en kısa zamanda 50 – 100 g. En dřk tedavi edici doz, genellikle vcut aėırlıėının kilogram bařına 1 gram'dır. Aktif karbon (1-2 řiře) uygulanmalıdır. Ciddi zehirlenme vakalarında tedaviye birka gn boyunca, her 4-6 saatte bir 160 mL (20 g aktif karbon) sspansiyon iilir. Doktorunuzun uygun grdė řekilde

tekrarlı dozlar 4-6 saatte bir kullanılır. Bilinci kapalı olan hastalarda süspansiyon, doktor veya hemşirenin tıbbi gözetimi altında doğrudan mide sondası ile uygulanmalıdır.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

CARBOMİX sadece ağızdan kullanım içindir.

Aplikatör kullanılarak süspansiyon halinde içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım

4-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz vücut ağırlığının her kg için yaklaşık 1 g aktif karbondur (10 mL süspansiyon). Akut zehirlenme vakalarında genel olarak ½ şişe uygulanmalıdır.

4 yaşından küçük çocuklarda doktor değerlendirmesi altında akut zehirlenme hallerinde ½ şişe birkaç kez uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanım

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışındaki özel bir doz ayarlanması gerekmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve CARBOMİX ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Eğer CARBOMİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla CARBOMİX kullandıysanız:

CARBOMİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Süspansiyonun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Bulantı, kusma, ishal.

CARBOMİX'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARBOMİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonrası dışkı siyah çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CARBOMİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CARBOMİX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Nadiren alerjik durumlar,
- Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi, solunum yollarının tıkanması,
- Ciltte döküntü veya kızarıklık meydana gelmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise aktif karbona karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

- Kabızlık
- Tıbbi karbonun yüksek dozları ince bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Bu durum laksatiflerin kullanılması ile önlenir.

Bunlar CARBOMİX'in hafif yan etkileridir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CARBOMİX'in saklanması

CARBOMİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CARBOMİX'i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CARBOMİX'i kullanmayınız.

Tedavi anında sulandırılmalı ve kalan miktar atılmalıdır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARBOMİX'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BELGA Sağlık ve Zirai Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1271.Sok. No.:15/10 06520
Balgat, Çankaya/Ankara
Tel.: (0312) 473 73 80
Faks: (0312) 473 73 78
e-mail: ankarabelga@belga.com.tr

Üretim yeri:

Norit Pharmaceuticals Klazienaveen
Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3, 7891 EV
Klazienaveen/Hollanda

Bu kullanma talimatı 16.11.2012 tarihinde onaylanmıştır.