

## KULLANMA TALİMATI

### DYSPORT 500 U enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

**Kas içine uygulanır.**

**Etkin madde:** Her flakon 500 ünite *Clostridium botulinum* tip A toksin-hemaglutinin kompleksi içerir.

**Yardımcı maddeler:** İnsan albumin çözeltisi, laktoz.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. *DYSPORT nedir ve ne için kullanılır?*
2. *DYSPORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *DYSPORT nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *DYSPORT'un saklanması*

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DYSPORT nedir ve ne için kullanılır?**

DYSPORT, *Clostridium botulinum* bakterisinden elde edilen bir toksindir ve kasların kasılmasını durdurarak çalışır. Bu, normal olarak kasların kasılmasını sağlayan ve sinirlerle kaslar arasında bulunan bir kimyasalın (asetilkolin) salımının engellenmesiyle gerçekleşir. Böylelikle "spazm" olarak bilinen anormal kas kasılmalarının azalması sağlanır.

DYSPORT kas içine uygulanan, dondurulmuş-kurutulmuş, beyaz renkli bir tozdur. DYSPORT flakonu içindeki toz, % 0.9 sodyum klorür çözeltisi içinde önce çözülerek, sonra seyreltilerek kullanılır. DYSPORT 3 ml'lik cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon tek bir doz içerir. Üniteler preperatlara özgüdür ve botulinum toksinin diğer preperatları ile değiştirilemez.

## DYSPORT;

- Yetişkinlerde, istem dışı göz kırpmaya ve gözlerin kapanmasına sebep olan göz kası fonksiyonu hasarında (blefarospazm),
- Yetişkinlerde, yüzün tek tarafında seyreden istem dışı kas kasılmalarında (hemifasiyal spazm),
- Yetişkinlerde boynun dönmüş pozisyonda kalarak baş ve omuzların olağan dışı duruşuna sebep olan durumlarda (spazmodik tortikolis),
- Yetişkin hastalarda kollarda görülen, kasların istek dışı, birdenbire ve şiddetli kasılmasında,
- Yetişkinlerde yaşam kalitesini etkileyen, bölgesel tedaviye dirençli ve kalıcı, fazla ter salgılanması (aksiller hiperhidroz) durumlarının tedavisinde,
- 65 yaşın altındaki hastalarda, kaşlar arasında oluşan orta veya şiddetli derecedeki dikey çizgilerin (glabella çizgileri) geçici olarak giderilmesinde,
- İki yaş veya üzeri, beyinle ilişkili felç (serebral palsi) gelişen çocuklarda, bacak kaslarının aşırı kasılması sonucu ayaklarda görülen hareket güçlükleri ve şekil bozukluklarında (dinamik ekinus ayak deformitesi) kullanılır.

## 2. DYSPORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### DYSPORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- DYSPORT içinde yer alan *Clostridium botulinum* toksin tip A-hemaglutinin kompleksi ya da bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
- Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya emziriyorsanız,
- Hastalığınızın belirtilerinde kötüleşme veya değişme meydana geldiğini düşünüyorsanız,
- Daha önce herhangi bir toksin enjeksiyonu uygulandığında olağan dışı etkiler (deride döküntü veya grip benzeri belirtiler gibi aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları) deneyimlediyseniz,
- Bronşit veya zatürre geçirdiyseniz, soluk almada güçlük veya uzun süre kas zayıflığı yaşadysanız. Spazmodik tortikolis için DYSPORT enjeksiyonunda bu koşulların tekrarlama riski daha fazladır.

### DYSPORT'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

- Yutma, konuşma veya nefes almada problem yaşıyorsanız derhal doktorunuzla iletişime geçiniz veya ambulans çağırınız.
- Yüzünüzde daha önceden bir ameliyatınız varsa doktorunuza bilgi veriniz.
- Kolayca kanama gösteren bir hastalığınız varsa doktorunuza bildirin.
- Enjeksiyonun yapılacağı yerde bir iltihaplanma varsa veya bu bölge şişmiş ise doktorunuzu bilgilendiriniz.

- Belirtili ve belirtsiz sinir-kas iletim bozukluklarında yakın gözlem ile dikkatli kullanılmalıdır (kaslarınızı etkileyen miyastenia gravis hastalığında).

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **DYSPORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DYSPORT normal şartlarda gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Ancak, sağlanacak fayda fetüs için potansiyel riski karşılıyorsa azami dikkatle kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

DYSPORT'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

DYSPORT kaslarda güçsüzlüğe ve görme bozukluklarına neden olabileceğinden, araç ve makine kullanım yeteneğinizi etkileyebilir.

Görme veya kas güçsüzlüğü ile ilgili problemlerinizi varsa araç veya makine kullanmayınız.

### **DYSPORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DYSPORT insan kanından elde edilen az miktarda albumin içermektedir. İnsan kanı veya insan kanından elde edilen ürünlerin kullanımı durumunda kandan enfeksiyon geçme riski tamamen ortadan kaldırılamamaktadır.

DYSPORT bileşiminde 2.5 miligram laktoz mevcuttur ancak; kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer bir enfeksiyon için herhangi bir antibiyotik ilaç (örn. gentamisin veya amikasin gibi aminoglikozidler) veya kas gevşetici ilaçlar kullanıyorsanız lütfen doktorunuza bildirin.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DYSPORT nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Bir DYSPORT flakonu yalnızca sizin için ve tek bir tedavi seansı için kullanılmalıdır. Tüm DYSPORT enjeksiyonları yalnızca hastanede gerçekleştirilir. DYSPORT yalnızca uygun eğitimi almış doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Doktorunuz size enjeksiyonu uygulayacak ve tedaviye hangi sıklıkta ihtiyaç duyacağınıza karar verecektir. Bu, sizin ne için tedavi gördünüze bağlıdır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Blefarospazm (göz çevresindeki kas kasılmaları) tedavisi:

Her iki gözün de etkilendiği durumda ilk enjeksiyon genellikle her bir göze uygulanan 40 ünedir. İlaç, göz çevresindeki çeşitli bölgelere, derinin hemen altına enjekte edilir. Enjeksiyonlar, etkilerin ne kadar süreceğine bağlı olarak yaklaşık her 12 haftada bir uygulanır. Uygulanacak doza doktorunuz karar verecektir. Verilen DYSPORT miktarı sonraki muayenelerde her göze 60, 80 veya 120 ünite olacak şekilde yükseltilebilir. Eğer yalnızca bir göz etkilenmişse, doktorunuz yalnızca o göz çevresine DYSPORT enjeksiyonu uygulayacaktır.

Hemifasiyal spazm (yüzde meydana gelen kas kasılmaları) tedavisi:

Enjeksiyonlar, blefarospazm için anlatıldığı şekilde yalnızca yüzün etkilenen tarafına uygulanır.

Spazmodik tortikolis (boyun ve omuzda meydana gelen kas kasılmaları) tedavisi:

İlk DYSPORT dozu, boyunda birkaç bölgeye (muhtemelen durumdan en çok etkilenen 2-3 boyun kasına) bölüştürülerek uygulanacak olan 500 ünedir. Enjeksiyonun uygulanacağı kaslara ve doza doktorunuz karar verecektir. Enjeksiyonlar, etkilerin kaslarda ne kadar devam ettiğine bağlı olarak 12 haftadan daha sık olmamak koşuluyla her 16 haftada bir uygulanacaktır. Bir sonraki enjeksiyonun zamanına ve dozuna doktorunuz karar verecektir.

Aksiller hiperhidroz (koltuk altında aşırı terleme) tedavisi:

Başlangıç dozu genellikle her koltuk altına 100 ünedir. İstenilen etki elde edilemezse, her bir koltuk altına maksimum 200 üneden fazla olmayacak şekilde takip eden enjeksiyonlar uygulanabilir. Enjeksiyonun gerçekleştirileceği alan iyot-nişasta testi ile önceden belirlenmelidir. Her iki koltuk altı da temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Maksimum etki, enjeksiyondan 1 ila 2 hafta sonra görülecektir. Çoğu vakada önerilen doz beklenen etkiyi elde etmede yeterli olmuştur ve etki yaklaşık 48 hafta sürmüştür. Sonraki enjeksiyonlar kişiye özel olarak belirlenmeli fakat, her 12 haftadan daha sık olmamalıdır. Tekrarlanan dozların gittikçe

artan bir etki potansiyeli bulunabilir; dolayısıyla size uygulanacak her tedavinin zamanı doktorunuz tarafından size özel olarak belirlenmelidir.

#### Kol ve omuzda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:

Uygulanacak DYSPORT dozu doktorunuz tarafından belirlenecek olup, genellikle 500 ila 1000 ünite arasındadır. Doktorunuz belirlenen dozu etkilenen kol ve omuz kasları arasında bölüştürebilir. Kas kasılmalarınız normal şartlarda 1 hafta içerisinde iyileşmelidir. Enjeksiyonlar yaklaşık 12-16 hafta arasında tekrarlanacaktır.

#### Orta ila şiddetli glabella çizgilerinin (alında kaşlar arasında oluşan çizgiler) görünüşünde geçici iyileştirme:

Önerilen doz genellikle 50 ünitedir (0.25 mL). Önerilen doz, her 5 enjeksiyon bölgesine 10 ünite (0.05 mL) olacak şekilde kas içerisine (intramüsküler) enjekte edilir.

Kırıklıklar enjeksiyondan sonraki 2-3 gün içerisinde azalmaya başlayacaktır. Etkiler genellikle 4 aya kadar sürer. İki tedavi seansı arasındaki süre en az 3 ay olmalıdır.

#### İki yaş veya üzeri, beyinle ilişkili felç (serebral palsi) gelişen çocuklarda bacak kaslarının aşırı kasılması sonucu ayaklarda görülen hareket güçlükleri ve şekil bozukluklarının (dinamik ekinus ayak deformitesi) tedavisi:

Başlangıç dozu genellikle çocuğun vücut ağırlığına göre kg başına 20 ünitedir. Doktorunuz uygulanacak miktarı her iki alt bacak kaslarına bölüştürecektir. Eğer kasılmalardan yalnızca bir bacak etkilenmişse, doktorunuz vücut ağırlığına göre kg başına 10 ünite dozu yalnızca etkilenen bacağı uygulayacaktır. Enjeksiyonlar genellikle her 16 haftada bir verilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

DYSPORT 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

DYSPORT sadece iki yaş veya üzeri, beyinle ilişkili felç gelişen çocuklarda ayaklarda görülen şekil bozukluklarında (dinamik ekinus ayak deformitesi) güvenle kullanılabilir.

Diğer hastalıklarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarda alın bölgesindeki çizgilerin giderilmesinde kullanımı yoktur.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Klinik çalışmalar dozaj ayarlanması gerekliliğini göstermemiştir.

- **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek/ karaciğer yetmezliği:**

Özel veri bulunmamaktadır.

*Eğer DYSPORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuza veya eczacınıza ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla DYSPORT kullandıysanız:**

Eğer ihtiyacınızdan fazla DYSPORT uygulandıysa, enjeksiyonun yapıldığı kasların dışında diğer kaslarda zayıflık hissedebilirsiniz. Bu hemen olmayabilir; böyle bir durum mevcutsa (kaslarda güçsüzlük hissi) derhal doktorunuza bildirin. Solunumda, yutmada veya konuşmada zorluk hissederseniz acilen tıbbi yardım alın.

*DYSPORT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DYSPORT'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Eğer bir enjeksiyon atlandıysa birtakım kasılmalar veya kas sertlikleri nüksedebilir. Durumu doktorunuza bildirin; doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

**DYSPORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

DYSPORT ile tedavi sonlandırıldığında kasların kasılması ve kas hareketleriniz tedavi öncesi duruma dönecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DYSPORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Toksin etkisinin enjeksiyon bölgesinin uzağındaki bölgelere dağılımından kaynaklanan yan etkiler sıklıkla bildirilmiştir.

DYSPORT enjeksiyonundan sonra, enjeksiyon bölgesinin yakınındaki kaslarda geçici değişimler meydana gelebilir. Ayrıca enjeksiyon bölgesinin yakınında morarma veya yanma hissi oluşabilir; bunlar enjeksiyonun uygulanmasını takiben 1-2 dakika kadar sürer.

DYSPORT uygulamasından sonra deri döküntüsü veya grip benzeri belirtiler gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.

Seyrek olarak nevralkjik amiyotropi (sinirsel kas erimesi) oluşabilir.

Aşırı kas güçsüzlüğü, yutma güçlüğü, ölümcül olabilen aspirasyon pnömonisi (yiyecek, içecek, tükürük veya kusma içeriğinin solunum yoluna kaçması ile oluşan) çok seyrek olarak bildirilmiştir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, DYSPORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Eğer yutma, soluk alma veya konuşmada herhangi bir problem yaşıyorsanız
- Eğer yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişlik, ciltte kızarıklık veya ürtikerle (kaşıntılı yumrulu döküntü) birlikte veya yalnızca solunum güçlüğü çekiyorsanız

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin DYSPORT'a karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Aşırı göz kuruluğu
- Özellikle yemek yemenize engel olan ve kilo kaybına sebep olabilen yutma güçlüğü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1,000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Herhangi bir durumun tedavisi (tüm hastalar):**

Yaygın: Enjeksiyonun yapıldığı bölgenin etrafında morarma veya ağrı, genel kuvvetsizlik, yorgunluk, grip-benzeri semptomlar.

Yaygın olmayan: Kaşıntı.

Seyrek: Deride döküntü, omuz ve/veya kolda aniden gelişen aşırı ağrı ve kuvvetsizlik (nevraljik amiyotrofi).

**Kol ve omuzda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:**

Yaygın: Kaslarda kuvvetsizlik, kas-iskelet ağrısı, halsizlik.

Yaygın olmayan: Yutmada güçlük, el ve parmaklarda ağrı.

### **Gözlerde veya yüzde meydana gelen kas kasılmalarının tedavisi:**

Çok yaygın: Üst göz kapağında düşüklük.

Yaygın: Çift görme, göz kapağında şişlik, yüz kaslarında kuvvetsizlik, göz kuruluğu veya normalden fazla gözyaşı.

Yaygın olmayan: Yüz felci.

Seyrek: Göz hareketlerinde zorluk, göz kapağı kenarlarının göz yuvarına doğru kıvrılması (entropion).

### **Boyunda meydana gelen kas kasılmalarının tedavisinde:**

Çok yaygın: Kaslarda kuvvetsizlik, yutmada güçlük (bu yan etkinin 2-4 hafta içinde geçmesi beklenebilir), ağız kuruluğu.

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme veya net görmeye ilgili diğer problemler, yüz kaslarında kuvvetsizlik, kas sertliği, nefes darlığı, ses tonunda değişiklik, boyun ağrısı, kas ağrısı, el ve parmaklarda ağrı.

Yaygın olmayan: Kas dokusu kaybı, çene problemleri, üst göz kapağında düşüklük, çift görme, bulantı.

Seyrek: Yiyecek, içecek, tükürük veya kusmuğun kazara solunmasından kaynaklanan akciğer iltihabı (aspirasyon pnömonisi).

### **Çocuklarda, bacakta meydana gelen kas kasılmalarının tedavisinde:**

Yaygın: Bacak kaslarında kuvvetsizlik (bu, yürüyüş şeklinizi değiştirebilir veya daha fazla düşmenize sebep olabilir), kas ağrısı, idrar kaçırma, ishal.

### **Aşırı terleme tedavisinde:**

Yaygın: Nefes darlığı, telafi edici terleme, omuz, boyun ve bacak kaslarında ağrı.

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı, kaslarda seğirme, göz kapağında istem dışı hareketler, kızarma, burun kanaması.

### **Kaslar arasında oluşan dikey çizgilerin tedavisinde:**

Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, morarma, kaşıntı, hissizlik, kızarma, döküntü), baş ağrısı.

Yaygın: Göz yorgunluğu, göz kapağında düşüklük, göz kapağında şişlik, normalden fazla göz yaşı, göz kuruluğu, kaslarda kasılmalar, enjeksiyon bölgesinde kas güçsüzlüğü (göz kapağının düşmesine, göz yorgunluğuna, yüz kaslarında felce veya görme bozukluklarına sebep olabilen).

Yaygın olmayan: Bulanık görme, çift görme, göz hareketlerinde bozukluk, aşırı duyarlılık, deride döküntü, kaşıntı.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. DYSPORT’un saklanması**

*DYSPORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

DYSPORT’u buzdolabında saklayınız (2°C - 8°C).

DYSPORT’un sulandırıldıktan sonra 2°C-8°C’de 24 saatlik stabilitesi kanıtlanmış olmasına rağmen hemen kullanılması önerilmektedir. Dondurmayınız.

Bu ilaç, evde saklamaları için hastalara verilmemektedir.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son gününe işaret etmektedir.

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DYSPORT’u kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DYSPORT’u kullanmayınız.

*Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız DYSPORT’u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.*

#### ***Ruhsat sahibi:***

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok.,

No:3, D:2-3, 06520,

Çankaya/ANKARA

Tel: + 90 (312) 219 62 19

Faks: + 90 (312) 219 60 10

Web: [www.genilac.com.tr](http://www.genilac.com.tr)

#### ***Üretici:***

Ipsen Biopharm Ltd.,

Ash Road, Wrexham Industrial Estate,

Wrexham LL 139 UF - Birleşik Krallık

*Bu kullanma talimatı .././... tarihinde onaylanmıştır.*