

## KULLANMA TALİMATI

**FLUREND® % 0,25 oral sprey**  
**Ağız içine püskürtülerek uygulanır.**

- **Etkin madde:** 30 ml oral sprey 0,075 g flurbiprofen içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserin, etil alkol (% 96), sorbitol (E420), kremofor RH40, sodyum sakkarin, sodyum hidroksit, sodyum benzoat (E211), nane esansı, deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **FLUREND® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FLUREND®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FLUREND® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FLUREND®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. FLUREND® nedir ve ne için kullanılır?**

Orofarenjiyal alana da bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihapları, yutak iltihapları) ağrılarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuvar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Diş tedavileri sonrasında da koruyucu olarak kullanılır.

FLUREND®, sprey pompası ile 30 ml'lik plastik beyaz opak şişede ve karton kutu ambalajda takdim edilmektedir.

#### **2. FLUREND®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**FLUREND®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Flurbiprofene veya ürünün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
- Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
- Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdiyseniz,
- Peptik ülseriniz varsa veya geçmişte bu hastalığı geçirdiyseniz.

## **FLUREND®'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer,

- Bbrek yetmezliđi, kalp yetmezliđi ya da karaciđer yetmezliđiniz varsa,

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

## **FLUREND®'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

FLUREND®'in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza syleyiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FLUREND® kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ila kesilmelidir.

## **Ara ve makine kullanımı**

FLUREND®'in ara ve makine kullanımına etkisi alıřılmamıřtır, fakat farmakodinamik zellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluřturması beklenmez.

## **FLUREND®'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

FLUREND®, sorbitol (E420) iermektedir. Eđer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

FLUREND®, her dozunda 10 g'dan daha az gliserin ierir. Bu dozda gliserine karřı herhangi bir etki beklenmemektedir.

FLUREND®, her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bađlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi rn, az miktarda [her dozda 100 mg'dan daha az] etanol (alkol) ierir.

FLUREND®, 30 ml'sinde 0,6 g sodyum benzoat (E211) iermektedir. Deriye, gze ve mukoz membranlarına hafif derecede iritandır.

## **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

FLUREND®, furosemidin diretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofen nadiren antikoaglan ilalarla etkileřime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile bir etkileřimi bulunmamaktadır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. FLUREND® nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

Gnde 3 defa ilgili blgeye dođrudan 2 pskrtme yapılarak uygulanır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

FLUREND® oral sprey ađızda ilgili blgeye pskrtlerek uygulanır.

**Değişik yaş grupları****Pediyatrik popülasyon:**

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

**Geriatrik popülasyon:**

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

**Özel kullanım durumları****Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

**Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

*Eğer FLUREND®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUREND® kullandıysanız**

*FLUREND®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**FLUREND®'i kullanmayı unutursanız**

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**FLUREND® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

FLUREND® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, FLUREND®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz**

- Hassasiyet bulguları
- Lokal iritasyonlar

Bunlar FLUREND®'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. FLUREND®'in saklanması**

*FLUREND®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

*25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra FLUREND®'i kullanmayınız.*

***Ruhsat Sahibi:*** Santa Farma İlaç San. A.Ş.  
Okmeydanı, Boruçiçeđi Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL  
Tel: (+90 212) 220 64 00  
Fax: (+90 212) 222 58 89

***Üretim yeri:*** Santa Farma İlaç San. A.Ş.  
Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL  
Tel: (+90 212) 534 79 00  
Fax: (+90 212) 521 06 44

*Bu kullanma talimatı 25.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.*