

## KULLANMA TALİMATI

### FUCİDOX %2 pomad

Haricen kullanılır.

**Etkin madde:** Bir gram pomad, 20 mg sodyum fusidat içerir.

**Yardımcı maddeler:** Susuz lanolin, setil alkol, sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için çok önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. ***FUCİDOX nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***FUCİDOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***FUCİDOX nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***FUCİDOX'un saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. FUCİDOX nedir ve ne için kullanılır?**

FUCİDOX 20 g'lık alüminyum tüplerde sunulur.

FUCİDOX'un etkin maddesi olan sodyum fusidat; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

FUCİDOX'a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

### **2. FUCİDOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**FUCİDOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Etkin maddeye veya içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
- *Pseudomonas aeruginosa* gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlar var ise kullanmayınız.

## **FUCİDOX' u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Ařađıdaki durumlarda size veya ocuđunuza FUCİDOX kullanılıp kullanılmayacađına doktorunuz karar verecektir.

- Gzde irritasyona sebep olabileceđinden gz vresindeki cilt enfeksiyonlarında
- Btn diđer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduđu gibi, uzun sreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılıđı ve antibiyotiđe karřı diren gelişmesi riski olduđunda.
- Aık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

“Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.”

### **FUCİDOX'un yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Yiyecek ve iecek ile etkileřimi bulunmamaktadır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FUCİDOX'un gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/zarar iliřkisi hekimce etraflı olarak deđerlendirmek kořulu ile kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FUCİDOX'un emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut deđildir. Ancak yarar/zarar iliřkisi hekimce etraflı olarak deđerlendirmek kořulu ile kullanılmalıdır.

Emzirenlerde meme bařı vresine uygulanmamalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiřtir.

### **FUCİDOX'un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

FUCİDOX setil alkol ve susuz lanolin ierdiđinden lokal deri reaksiyonlarına (rneđin, kontakt dermatit) sebebiyet verebilir.

### **Diđer ilalarla birlikte kullanımı**

FUCİDOX iin bildirilmiř bir ila etkileřimi yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. FUCİDOX nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

FUCİDOX lezyonlara gnde 2-3 kez ve lezyonlar zerine, iyileřme sađlanana kadar uygulanır.

Uygulamadan sonra lezyonun zeri kapatılabilir veya aık kalabilir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

FUCİDOX cilt yüzeyine haricen uygulanır.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

**Özel kullanım durumları:****Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

*Eğer FUCİDOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDOX kullandıysanız**

*FUCİDOX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**FUCİDOX'u kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**FUCİDOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi FUCİDOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Cilt döküntüleri
- Ciltte yanma, kızarma, döküntü
- İritasyon

Bunlar FUCİDOX'un hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan 'İlaç Yan Etki Bildirimi' ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. FUCİDOX'un saklanması**

*FUCİDOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, direkt gün ışığı ve sıcaktan koruyarak saklayınız.*

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCİDOX'u kullanmayınız.*

### ***Ruhsat sahibi:***

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No: 2  
06935, Sincan/ANKARA

Tel : 0312 267 11 91(pbx)

Fax : 0312 267 11 99

### ***Üretim yeri:***

Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Cad. No: 2  
06935, Sincan/ANKARA

Tel : 0312 267 11 91(pbx)

Fax : 0312 267 11 99

*Bu kullanma talimatı 15.10.2015 tarihinde onaylanmıştır.*