

KULLANMA TALİMATI

FUNDERYL %1 sprey
Deri üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 ml sprey etkin madde olarak 10 mg naftifin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı madde(ler):** Propilen glikol, etanol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **FUNDERYL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FUNDERYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FUNDERYL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FUNDERYL'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. FUNDERYL nedir ve ne için kullanılır?

FUNDERYL naftifin isimli etkin maddeyi içerir ve mantar enfeksiyonlarının harici tedavisinde kullanılır. FUNDERYL deri mantarları, maya mantarları, küf mantarları ve diğer mantarlara karşı etkinlik gösterir. FUNDERYL aynı zamanda mantar enfeksiyonlarında sıklıkla oluşan farklı birçok bakteriye karşı da etkilidir.

FUNDERYL sprey şeklinde 20 ml'lik ambalajlarda sunulmaktadır.

Ayaklar, özellikle ayak parmak araları, ayak tabanı (kızarıklık, pullanma ve şişkinlik ya da kaşıntılı kabarcıklar olarak görülür) ve tırnaklarda oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde deri üzerinde kullanılır.

2. FUNDERYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUNDERYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Naftifin, propilen glikol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

FUNDERYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Deride şişme, kaşıntı veya kızarıklık oluşursa doktorunuza söyleyiniz.

Yalnızca haricen kullanım içindir, göze temas ettirmeyiniz ve açık yaralara uygulamayınız. Eğer hastalığınızın belirtileri iyileşmezse ve ilacınız beklenen etkiyi göstermezse doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FUNDERYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Deri üzerine sürülerek uygulandığından, yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, doktorunuz önermedikçe FUNDERYL kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından önerilmediği müddetçe emzirme döneminde FUNDERYL kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine etkisi gözlenmemiştir.

FUNDERYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan propilen glikol ciltte iritasyona (tahriş) neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FUNDERYL'in diğer ilaçlar ile etkileştikğine dair bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FUNDERYL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

FUNDERYL'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından farklı bir doz önerilmemişse, FUNDERYL günde bir kez, tercihen akşamları, hastalıklı bölgeye püskürtülür.

Solüsyon, hastalıklı derinin çevresindeki sağlıklı derinin yaklaşık 2 cm dışına taşacak biçimde uygulanmalıdır.

Kaşıntı gibi belirtilerin çok çabuk ortadan kaybolmasına karşın nüksü önlemek için tedavi, bütün hastalık belirtileri kaybolduktan sonra 1-2 hafta daha sürdürülmelidir. Toplam tedavi süresi, enfeksiyondan sorumlu mantar türüne, enfeksiyonun yerine ve şiddetine bağlıdır.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ařađıdaki durumları dikkate alınız:

- Mantar enfeksiyonuna yol aan organizmalar giysilerinize geebileceđinden giysiler her gn deđiřtirilmelidir.
- Enfeksiyonlu deriyi kuru tutunuz. Dar ve hava geirmeyen giysiler giymekten kaınınız (dar ayakkabılar ierisine sentetik oraplar gibi)
- Yıkandıktan sonra enfeksiyonlu blgeyi kurulaınız ve kullanılan bez ile havluları her gn deđiřtiriniz.
- Eđer ayađınızda mantar enfeksiyonu varsa, bařkalarına bulařmasını engellemek ve kendinizde enfeksiyonun tekrarlamasına sebep olmamak iin evde, havuzda veya otel gibi yerlerde ıplak ayakla dolařmaktan kaınınız.
- Mantar enfeksiyonunuz tamamen iyileřinceye kadar sauna veya buhar banyosuna gitmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri veya tırnak zerine pskrtlerek uygulanır.

Uygulamadan nce hastalıklı deri ya da tırnak blgesi ılık su ile yıkanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

Ambalaj ilk aıldıđında, ilacın pskrmesi iin pompaya birkaç kez basılması gerekir. Solsyon pskrmeye bařladıđında, her basıřta 1 ml FUNDERYL pskrtlr. zel tasarımı sayesinde, řiřenin her pozisyonunda pompa kolaylıkla alıřtıđından, vcut kıvrımlarına yerleřmiř enfeksiyonlara ulařmak mmkndr.

Deđiřik yař grupları:

ocuklarda kullanımı:

ocuklarda etki ve gvenilirliđi konusunda henz arařtırma yapılmamıřtır.

Yařlılarda kullanımı:

Yařlılarda kullanımı incelenmemiřtir.

zel kullanım durumları:

Bbrek yetmezliđi/ Karaciđer yetmezliđi

Bbrek/karaciđer yetmezliđi olan hastalarda kullanımı incelenmemiřtir.

Eđer FUNDERYL'in etkisinin ok gl veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNDERYL kullandıysanız:

FUNDERYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız bir doktor veya eczacı ile konuřunuz.

FUNDERYL'i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.

FUNDERYL ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler

Tedavinizi sonlandırmadan nce mutlaka doktorunuza danıřınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi FUNDERYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın (10 kişide 1'den az, fakat 100 kişide 1'den fazla): Deride yanma, batma, kaşıntı

Yaygın olmayan (100 kişide 1'den az, fakat 1000 kişide 1'den fazla): Eritem (deri üzerinde oluşan kızarıklık), deri hassasiyeti

Yan etkiler her zaman geri dönüşümlüdür ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. FUNDERYL'in saklanması

FUNDERYL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FUNDERYL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNDERYL'i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Solebio İlaç Sanayi İthalat İhracat A.Ş.
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Beyan Sok.
No:12 34775 Ümraniye/İSTANBUL

Üretim yeri:

Pharmactive İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B., Karaağaç Mah, Fatih Bulvarı No:32
Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 06.04.2017 onaylanmıştır.