

## KULLANMA TALİMATI

### GASVİN Likit

Ağız yoluyla alınır.

**Etkin madde:** Her 10 ml'de;

Sodyum Aljinat 500.0 mg

Sodyum Bikarbonat 267.0 mg

Kalsiyum Karbonat 160.0 mg

**Yardımcı madde(ler):** Karbomer 974 P, Sodyum Hidroksit, Metil Paraben, Propil Paraben, Ksantan Gum, Sodyum Sakarin, Nane Aroması, Deiyonize Su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***GASVİN Likit nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***GASVİN Likit'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***GASVİN Likit nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***GASVİN Likit'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. GASVİN nedir ve ne için kullanılır?**

GASVİN; krem renkli, nane kokulu bir sıvıdır.

GASVİN; karton kutu içerisinde amber renkli 200 ml lik şişede temin edilir.

GASVİN, reflü özofajit (yemek borusu iltihabı) kaynaklı şikayetleri olan hastalarda, gebelikte ya da yemeklerden sonra oluşan (reflüden kaynaklanan) hazımsızlık, mide yanması ve mideden ağza asit gelmesi gibi gastroözofageal reflü (mide ve yemek borusu iltihabı) belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

## **2. GASVİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **GASVİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eğer;

- GASVİN içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa (Nefes almada güçlük veya deri döküntüleri meydana gelmişse)

### **GASVİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin için söz konusuysa, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir:

- Doktorunuz tarafından sodyum ve/veya kalsiyum kısıtlaması önerilmişse,
- Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
- Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
- Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
- Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa.

*Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.*

### **GASVİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

GASVİN yemeklerden sonra ağız yoluyla uygulanır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

GASVİN, gebelik döneminde kullanılabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız*

GASVİN, emzirme döneminde kullanabilir.

### **Araç ve makine kullanımı**

GASVİN'in araç ve makine kullanımını etkilemesi beklenmemektedir.

### **GASVİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Her 10 ml doz, 134.23 mg sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu tıbbi ürün her bir 10 ml'sinde 160 mg (1,6 mmol) kalsiyum karbonat içerir. Kanda kalsiyum miktarı yüksek olan ve tekrarlayan böbrek taşı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında GASVİN'in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarla birlikte GASVİN kullanımı arasında 2 saat ara verilmelidir:

- H2-antihistaminikler (mide yanması için),
- Tetrasiklinler, norfloksasin gibi kinolon grubu antibiyotikler (enfeksiyon tedavisi için),
- Demir içeren ilaçlar,
- Ketokonazol (mantar için),
- Tiroksin (tiroid hastalığı için),
- Atenolol, metoprolol, propranolol gibi beta-blokörler ve digoksin (kalp hastalıkları için),
- Nöroleptikler (sinir hastalıkları için)
- Glukokortikoid (bir çeşit hormon ilacı)
- Klorokin (sıtma için)
- Bifosfonatlar (kemik erimesi için)

*Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.*

### **3. GASVİN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

GASVİN, ağızdan alınarak ve kutu içerisindeki 5, 10, 15 ve 20 mL işaretli plastik ölçek ile kullanılır.

GASVİN, yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 mL kullanılır.

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve GASVİN ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Tedaviyi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Doktorunuz başka şekilde önermemişse, GASVİN'i aşağıdaki gibi kullanınız.

**Uygulama yolu ve metodu:**

GASVİN, ağızdan alınarak kullanılır.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

6-12 yaş arası çocuklarda yemeklerden sonra ve yatarken 5-10 mL.

12 yaşından büyük çocuklar için yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 mL'dir.

12 yaşın altındaki çocuklarda sadece doktor tavsiyesi üzerine verilmelidir.

6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı: Doz ayarlaması gerekmez.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:** Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

**Karaciğer yetmezliği:** Özel kullanımı yoktur.

*Eğer GASVİN'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla GASVİN kullandıysanız:**

Bu üründen kullanmanız gerekenden daha fazla kullanırsanız herhangi bir zarar oluşması beklenmez, ancak karnınızda şişkinlik hissedebilirsiniz.

*GASVİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**GASVİN'i kullanmayı unutursanız**

Bir doz almayı unuttuğunuzda, bir sonraki seferde iki doz almanız gerekmez, unutulmuş dozu atlayarak ilacınızı normal dozunda kullanmaya devam edin.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **GASVİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

7 gün sonunda belirtiler düzelmediği takdirde doktorunuza danışınız.

#### **4. Olası yan etkileri nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi GASVİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, GASVİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Deri döküntüleri
- Nefes almada güçlük
- Baş dönmesi
- Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. GASVİN'in saklanması**

30 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.

Ürünü almadan önce kapak emniyetinin kırık olmadığını kontrol ediniz.

*GASVİN'i çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GASVİN'i kullanmayınız.*

***Ruhsat sahibi:***

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah.Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303 Küçükçekmece /İSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

***Üretim yeri:***

Deva Holding A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:32

Kapaklı / TEKİRDAĞ

*Bu kullanma talimatı 12/04/2016 tarihinde onaylanmıştır.*