

KULLANMA TALİMATI

PANTENOL PLUS Krem

Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** 30 gr tüp 1.50 gr Dekspantenol ve 0.15 gr Klorheksidin Hidroklorür içerir.
- **Yardımcı Madde(ler):** Setilstearyl alkol, kremofor A 6, kremofor A 25, sıvı parafin, metil paraben, propilen glikol, distile su

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de PANTENOL PLUS'tan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. PANTENOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. PANTENOL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. PANTENOL PLUS nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. PANTENOL PLUS'ın saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. PANTENOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

- PANTENOL PLUS, etkin madde olarak dekspantenol ve klorheksidin hidroklorür içerir ve beyaz, pütürsüz, homojen görünüşlü, kremdir.

- 30 gram krem içeren polipropilen vidalı kapaklı, alüminyum tüple, Kullanma Talimatı ile birlikte karton kutu içerisinde kullanımına sunulmaktadır.
- Enfeksiyon riski olan tüm yüzeysel yara türleri, bacak ülseri (yarası) ve dekübit ülser (yatak yarası) gibi kronik yaralar, cilt enfeksiyonları, emziren annelerde çatlak meme uçlarının tedavisi ve anüs çatlakları tedavisi, doku harabiyeti, cerrahi yaralar için kullanılır.
- Derinin daha hızlı ve daha düzgün bir dokuyla kapanmasına yardımcı olur.
- Cildi esnek ve nemli tutar.

2. PANTENOL PLUS 'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

PANTENOL PLUS 'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- PANTENOL PLUS'ın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
- Ciddi, derin veya çok kirli yaralar. Bu türden yaraların doktor tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir.
- PANTENOL PLUS'ı sabunla, diğer antiseptiklerle veya dezenfektanlarla aynı anda kullanmayınız.

PANTENOL PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Göz, kulak ve vücudun ağız, burun içi, vagina gibi alanlarını kaplayan mukoz membranlar (zar) ile temasından kaçınınız.
- Tahriş olmuş deride enfeksiyon riski bulunmuyorsa (örneğin güneş yanıkları) PANTENOL PLUS kullanılması önerilmez. Bu türden durumlarda, yayılması kolay olduğundan ve kolayca nüfuz edebildiğinden, ayrıca nemli yaralar, tüylü bölgeler ve derinin aşınmaya maruz kalan yerlerinde (yüz, dirsekler veya el gibi) kullanıma uygun olduğundan sulu bir formülasyon olan PANTENOL KREM tavsiye edilir. Koruyucu bir bariyerin olması gerekiyorsa (örneğin bebek bezi nedeniyle bebekte veya emziren annelerin memesinde görülen kızarıklık) veya deri çok kuruyorsa yağ oranı yüksek olan PANTENOL POMAD'ın kullanılması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

PANTENOL PLUS'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

Uygulama yntemi aısından yiyecek ve ieceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

PANTENOL PLUS hamilelik dnemi boyunca kullanılabilir ancak geniş deri yzeyine uygulanmamalıdır.

İlacı kullanmadan nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

PANTENOL PLUS emzirme dnemi boyunca kullanılabilir ancak geniş deri yzeyine uygulanmamalıdır.

İlacı kullanmadan nce doktorunuza ya da eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımı zerine bir etkisi yoktur.

PANTENOL PLUS'ın ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

PANTENOL PLUS, ieriėinde bulunan metil paraben nedeni ile alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

PANTENOL PLUS, ieriėinde bulunan setilstearyl alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına sebebiyet verebilir.

PANTENOL PLUS, ieriėinde bulunan propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona sebebiyet verebilir.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

PANTENOL PLUS'ın deri zerine nerildiėi şekilde kullanımında herhangi bir ila etkileşimi bildirilmemiřtir.

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Klorheksidin hidroklorr, sabun gibi bileřikler ile geimsizdir. PANTENOL PLUS'ı bařka antiseptik maddeler ile aynı zamanda kullanmayınız.

3. PANTENOL PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yara ve yanıklarda: PANTENOL PLUS günde bir iki kez veya gerekli görüldüğü takdirde daha sık uygulanır.

Emziren annelerin meme bakımında ve ağrılı, çatlamış meme başlarını iyileştirir. PANTENOL PLUS her emzirmeden sonra meme başlarına sürülür.

Emzirmeden önce meme başı su ile temizlenmelidir.

Pişiklerde: Her bez değişiminde PANTENOL PLUS uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

PANTENOL PLUS, deri üzerinde tahriş olmuş bölgeye ince bir tabaka halinde mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer PANTENOL PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PANTENOL PLUS kullandıysanız:

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullanmanız halinde herhangi bir istenmeyen etki görülmesi beklenmemektedir.

PANTENOL PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PANTENOL PLUS'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

PANTENOL PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi PANTENOL PLUS 'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu etkiler herkeste görülmez.

PANTENOL PLUS ile gözlenen yan etkiler, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır, çok yaygın ($\geq 1/10$); yaygın ($\geq 1/100$ ila $< 1/10$); yaygın olmayan ($\geq 1/1000$ ila $< 1/100$); seyrek ($\geq 1/10.000$ ila $< 1/1.000$); çok seyrek ($< 1/10.000$), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar ve temas dermatiti (bir tür deri hastalığı) gibi alerjik deri reaksiyonları, alerjik dermatit (bir tür deri hastalığı), kaşıntı, deride kızarıklık (eritem), kaşıntıyla beraber kabarcıkların oluşması (egzema), isilik, ürtiker (kurdeşen), deri hassasiyeti ve sıvı dolu kabarcıkların oluşması

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan ya da almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PANTENOL PLUS'ın saklanması

PANTENOL PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANTENOL PLUS'ı kullanmayınız.

Eğer ambalajların hasar gördüğünü fark ederseniz PANTENOL PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303
No: 1 Kat: 1
Küçükçekmece / İstanbul

İmal yeri:

Deva Holding A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi,
Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı .../.../.... tarihinde onaylanmıştır.