

# KULLANIM KILAVUZU

## MİNADEx FER ŞURUP

### FORMÜLÜ

Her 5 ml' de etken madde olarak;

A Vitamini	650 IU
D Vitamini	65 IU
Demir	12 mg
Potasyum Gliserofosfat	2.25 mg
Kalsiyum Gliserofosfat	11.25 mg
Mangan Sülfat	0.38 mg
Bakır Sülfat	0.5 mg

Koruyucu olarak sodyum metil hidroksi benzoat; tatlandırıcı olarak şeker ve glukoz; koku verici olarak portakal yağı içerir.

### TIBBİ ÖZELLİKLERİ

Bileşiminde bulunan;

**A vitamini**, gelişimin uyarılmasında, cilt ve mukozaların bütünlüğünün sağlanmasında, solunum yolu mukozalarının enfeksiyondan korunmasında ve gece körlüğünün önlenmesinde rol oynar.

**D vitamini**, vücutta kalsiyum ve fosforun kullanımını düzenler, kemik ve dişlerin normal olarak gelişmesini sağlar.

**Demir**, kan yapımında, dokulara oksijen taşınmasında ve kaslarda oksijen depolanmasında rol oynar.

**Potasyum**, sinirsel uyarıların iletilmesinde, kas kasılmasında ve kan basıncının kontrolünde rol oynar.

**Kalsiyum**, kemik ve dişlerin gelişiminde önemli görevi olan bir mineraldir, ayrıca sinirsel uyarıların iletilmesinde, kas kasılmasında ve kan pıhtılaşma mekanizmasında rol oynar.

**Mangan**, çeşitli reaksiyonların gerçekleştirilmesinde,

**Bakır**, ise kan yapımında rolü olan mineraldir.

### ÖNERİLEN KULLANIM YERİ

Bebekler ve çocukların günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla beslenmeye destek olarak kullanılır.

### KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

## UYARILAR / ÖNLEMLER

Yüksek dozlarda alındığında hipervitaminoza yol açabileceği unutulmamalıdır. Diğer vitamin ihtiva eden preparatlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

- Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

## YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Aşırı dozlarda uzun süreli kullanımı halinde hipervitaminoza bağlı yan etkiler görülebilir. Allerjik deri döküntüleri, mukoza ülserasyonları gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. İstenmeyen bir etki gördüğünüzde lütfen Sağlık Bakanlığı İlaç Advers Etki İzleme ve Değerlendirme Merkezi ( TADMER )' ne bildiriniz.

## GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

6 ay – 3 yaş arası çocuklar; Günde 2 kez 5 ml ( 1 tatlı kaşığı )

3- 12 yaş arası çocuklar; Günde 3 kez 5 ml ( 1 tatlı kaşığı )

Erişkinler ; Günde 3 kez 10 ml ( 2 tatlı kaşığı )

Minadex Fer Şurup yemeklerden sonra kullanılır. Su veya süte karıştırılıp kullanılabilir. Her kullanımdan önce çalkalanmalıdır.

## TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

200 ml'lik amber renkli şişelerde

**İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ** : ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.  
Zincirlikuyu / İstanbul

**ÜRETİCİ ADI VE ADRESİ** : Seven Seas Ltd. ( Marfleet, Hull / İngiltere )

Ağzı sıkıca kapalı olarak 25° C' nin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız ; ısı ve ışıktan koruyunuz.

**İZİN TARİH VE NUMARASI** : 17. 01. 2003 – 2003 / 5

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.**