

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

İsim: Centrum Junior

Birim formülü

| Bir tablet içeriği: Ortalama değerler | | %EC Yetişkin ÖGD+ |
|--|---------|----------------------------------|
| A Vitamini | 1100 IU | 41 |
| D3 Vitamini | 125 IU | 62 |
| E Vitamini | 7.5 IU | 68 |
| C Vitamini | 50 mg | 83 |
| Folik asit | 200 µg | 100 |
| Tiamin (B1 Vitamini) | 0.5 mg | 36 |
| Riboflavin (B2 Vitamini) | 0.5 mg | 31 |
| Niasin | 5.0 mg | 28 |
| B6 Vitamini | 0.5 mg | 25 |
| B12 Vitamini | 1 µg | 100 |
| Pantotenik asit | 2.5 mg | 42 |
| Biotin | 50 µg | 33 |
| K1 Vitamini | 10 µg | + |
| Kalsiyum | 14.3 mg | + |
| Fosfor | 10.9 mg | + |
| Demir | 4.5 mg | 32 |
| Magnezyum | 40 mg | 13 |
| Mangan | 0.5 mg | + |
| Selenyum | 12.5 µg | + |
| Potasyum | 1.75 mg | + |
| Klor | 1.6 mg | + |
| Çinko | 2.8 mg | 28 |

Tatlandırıcı olarak Aspartam içerir.

Tıbbi özellikleri:

Çocuklar, 4-10 yaş arasında, yavaş fakat sürekli olarak büyümeye devam ederler. Besin alımları günden güne farklılık gösterir, ve eksiksiz bir multimineral – multivitamin desteği kullanımı çocukların hayata sağlıklı başlamaları için gerekli tüm vitamin ve mineralleri aldıklarını garanti eder.

Kalsiyum, çocukluk süresince özel bir önem taşımaktadır. Sağlıklı kemikler ve dişlerin oluşumu, gelişmesi ve gelecek yıllarda bakımı için gereklidir. Henüz gençken ve ergenlikte

büyüme süresince, çocukların kalsiyumca zengin bir beslenme programı izlemeleri, gelecekte kemik sağlığını desteklemek açısından çok önemlidir.

Demir, konsantrasyon ve çalışma performansı açısından gerekli kan hücrelerinin vücut içinde sağlıklı çalışması için gereklidir. Demir, beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasında çok önemli olup, sinirsel mesajların vücudun üst ve alt tarafına iletilmesine yardımcı önemli kimyasalların üretiminde gereklidir. Beslenme programına yeterli miktarda demir alımının önemine rağmen, aşırı miktardaki demir özellikle küçük çocuklar için tehlikeli olabilir. Bu nedenle, demir içeren besin desteklerini ve ilaçları daima, çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

A, C, E vitaminleri önemli antioksidanlardır. Hastalık, kirlilik, sigara dumanına maruz kalma ve aşırı güneş ışığından kaynaklanan serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı vücudu korumada gereklidir.

Önerilen kullanım yeri :

Centrum Junior 4-10 yaş arası çocukların günlük mineral-vitamin ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılır.

Kullanılmaması gereken durumlar:

Centrum Junior içeriğinde yer alan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

Uyarılar/ Önlemler:

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Uzun süre aşırı miktarda A ve D vitamini alınması hipervitaminoza neden olabilir. Bileşiminde demir bulunmasına bağlı olarak, dışkı siyah renk alabilir. Başka vitamin ihtiva eden preparatlar ile kullanılmamalıdır. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

Doz aşımı durumunda veya çocuk tarafından kaza ile yutulmuşsa profesyonel yardım alabileceğiniz bir merkeze başvurunuz. Doktor tarafından istenmedikçe hasta kusturulmamalıdır.

Yan etkiler/ Advers etkiler:

İlacın istenen etkisinin yanı sıra, ilacın alındığı süre boyunca sindirim güçlüğü gibi advers reaksiyonlar oluşabilir. Yüksek dozda kullanıldığında hipervitaminoza yol açar. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler:

Centrum Junior'ı, başka bir ilaç ile aynı zamanda veya diğer bir ilaçla tedavinin hemen ardından kullanmak gerektiğinde, ilaç etkileşimlerinden kaynaklanabilecek riskleri veya istenen etkinin azalmasını önlemek için bir doktora danışınız.

Centrum Junior'ın A ve D vitaminlerini içeren ilaçlarla birlikte alınması durumunda, doz aşımı riski olasılığından dolayı, önerilen doz aşılmamalıdır.

Tetrasiklinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Centrum Junior'ın levodopa ile birlikte alınması yalnızca dopa dekarboksilaz inhibitörü ile beraber kullanılıyorsa mümkündür.

Günlük kullanım şekli ve dozu:

4 ve 10 yaş arası çocuklar için günde 1 tablet alınması önerilir. Tabletler çiğnenerek veya emilerek kullanılmalıdır.

Saklama koşulları:

Her kullanımdan sonra kapağı kapatınız ve 25°C' nin altında, kuru bir yerde saklayınız. Şişeler hava ve nemden korunmak için ağzı sıkıca kapalı saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari takdim şekli:

Centrum Junior Tablet, 30 tablet içeren polietilen çocuk kilitli, kapaklı şişelerde.

İzin tarih ve no: 22.06.2001-2001/39

İzin sahibi: Pfizer PFE İlaçları A.Ş. 34347 Ortaköy- İSTANBUL

Üretim yeri: Pfizer Canada Inc. Quebec /Kanada

Ambalajlama yeri: Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l Aprilia, İtalya

SADECE ECZANELERDE SATILIR.