

## KULLANMA TALİMATI

### HELKORT %2 Krem

Haricen kullanılır.

**Etkin madde** : Bir gram krem, 20 mg Fusidik asit (sığır sütü tozundan üretilir) içerir.  
**Yardımcı maddeler** : Likit parafin, setil alkol, beyaz vazelin, polisorbit 60, gliserin (sığır/koyun iç yağı kaynaklı), potasyum sorbat, bütihidroksianisol, deiyonize su içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında :**

- 1. HELKORT Nedir ve Ne İçin Kullanılır?**
- 2. HELKORT Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler**
- 3. HELKORT Nasıl Kullanılır?**
- 4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?**
- 5. HELKORT'un Saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. HELKORT Nedir ve Ne İçin Kullanılır?**

HELKORT 20g'lık alüminyum tüplerde sunulur.

HELKORT'un etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

HELKORT'a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

### **2. HELKORT'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler**

**HELKORT'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

- Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı

- duyarlı) iseniz,
- *Pseudomonas aeruginosa* gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.
  - Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde alerjik reaksiyonlara neden olur.

### **HELKORT' u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza HELKORT kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

- Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında,
- Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

### **HELKORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

HELKORT'un yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

HELKORT'un gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

HELKORT'un emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır. Emzirmeden önce meme başı çevresi temizlenmelidir, bu çevreye uygulanmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

HELKORT merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

### **HELKORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Butilhidroksianisol ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

HELKORT için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı, bitkisel ürünü vitamin ya da minerali şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

**3. HELKORT Nasıl Kullanılır?****Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

HELKORT lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

HELKORT cilt yüzeyine haricen uygulanır.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda Kullanımı:**

HELKORT'un çocuklarda kullanımını için herhangi bir kısıtlama yoktur.

**Yaşlılarda kullanımı:**

HELKORT'un yaşlılarda kullanımını için herhangi bir kısıtlama yoktur.

**Özel Kullanım Durumları:****Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:**

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir

*Eğer HELKORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla HELKORT kullandıysanız:**

*HELKORT'dan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**HELKORT'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

**HELKORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

**4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi HELKORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, HELKORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

‘Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HELKORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Cilt döküntüleri
- Ciltte yanma, batma hissi
- İrritasyon
- Kuruma

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzama, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma

‘Bunlar HELKORT’un hafif yan etkileridir.’

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

### **5. HELKORT’un Saklanması**

*HELKORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altında oda sıcaklığında direkt gün ışığından ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HELKORT’u kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Veysel Karani Mahallesi Çolakoğlu Sk.  
No: 10 Sancaktepe / İstanbul  
Telefon : 0553 303 02 25

Faks : 0216 564 80 99

**Üretim Yeri:** ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş  
Necipbey Cad. No:88 55020  
SAMSUN  
Tel: 0 362 431 60 45  
Fax: 0 362 431 96 72

*Bu kullanma talimatı 14/04/2021 tarihinde onaylanmıştır.*