

## KULLANMA TALİMATI

### PODORA 200 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 200 mg Sefpodoksim'e eşdeğer 260,90 mg sefpodoksim proksetil
- **Yardımcı madde:** Kalsiyum karboksimetil selüloz, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz), hidroksi propil selüloz, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, talk, lesitin (soya kaynaklı), ksantan gum

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu kullanma talimatında:**

- 1. PODORA nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. PODORA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.***
- 3. PODORA nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. PODORA'nın saklanması.***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. PODORA nedir ve ne için kullanılır?**

Her bir film kaplı tablet 200 mg sefpodoksime eşdeğer sefpodoksim proksetil içerir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubunda yer alır. Bakteriyel hücre duvarı sentezine engel olarak bakterileri öldürürler ve sefalosporinler enfeksiyonları tedavi eder.

PODORA, 10, 14 ve 20 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda, karton kutu içinde takdim edilir.

PODORA, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

- Alt solunum yolu enfeksiyonlarında (kronik bronşit, toplumda kazanılmış zatürre, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi),
- Üst solunum yolları enfeksiyonlarında [farengit (yutak iltihabı), bademcik iltihaplanması, akut orta kulak iltihabı, sinüzit (kafa içindeki boşlukların iltihabı)],
- Seksüel yolla bulaşan hastalıklarda (gonore),
- Kadınlarda görülen akut komplike olmayan makat bölgesi enfeksiyonlarında,
- İdrar yolu enfeksiyonları (sistit ve böbrek iltihabı),
- Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında.

## **2. PODORA'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**PODORA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eğer,

- Sefpodoksim'e ya da sefalosporin grubu antibiyotiklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,
- Penisilin içeren antibiyotiklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise bu ilacı kullanmayınız.

**PODORA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Eğer,

- Karın ağrısı ve şiddetli ishal probleminiz (kolit) varsa,
- Böbrek problemlerinizi varsa, bu ilacı kullanırken dikkatli olunuz.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

## **PODORA'nın yiyecek ve iecek ile kullanılması**

PODORA'yı a ya da tok karnına alabilirsiniz.

## **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- PODORA'yı hamilelik sırasında yalnızca, doktorunuz dikkatli bir risk-yarar deęerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli gryorsa kullanmalısınız.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

## **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*
- PODORA anne stne gemektedir ancak bebek zerine etkisi bilinmemektedir. Eęer emziriyorsanız PODORA'yı kullanmayınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

- PODORA alırken sersemlik hissi oluřabileceęinden, byle bir durumda ara ve makine kullanım becerisi bozulabilir. Bu ilacı aldıęınızda ara ve makine kullanmayınız.

## **PODORA'nın ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

PODORA laktoz monohidrat ierdięi iin; eęer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduęu sylenmiře bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

PODORA soya ihtiva eder. Eęer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi rn kullanmayınız.

## **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

- Antasitlerin (sodyum bikarbonat ve alminyum hidroksit) yksek dozlarda uygulanması veya H<sub>2</sub> blokerleri (simetidin, famotidin, ranitidin gibi) sefpodoksimin etkisini azaltabilir.
- Dięer betalaktam antibiyotiklerle de olduęu gibi, probenesid sefpodoksim'in bbreklerden atılımını engeller ve dolayısıyla sefpodoksimin etkisini arttırabilir.

- Sefpodoksim proksetil ile birlikte aminoglikozid antibiyotikler veya idrar söktürücü ilaçlar gibi nefrotoksik potansiyeli olan bileşiklerden alacaksanız böbrek fonksiyonunuzun kontrol edilmesi gerekebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PODORA nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Doktorunuz başka şekilde önermediyse PODORA'yı aşağıdaki şekilde kullanınız:

Yetişkinlerde (13 yaş ve yukarısı):

*Üst solunum yolu enfeksiyonları:*

Sinüzit (kafa içindeki boşlukların iltihabı) tedavisinde doz günde 2 kez 200 mg tablettir. Farenjit (yutak iltihabı) ve/veya bademcik iltihabı tedavisinde doz günde 2 kez 100 mg tablettir.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Kronik bronşit, toplumda kazanılmış zatürre, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi doz günde 2 kez 100 mg veya 200 mg tablettir.

*Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları:*

Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonlarında doz günde 2 kez 100 mg tablettir.

Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonlarında doz günde 2 kez 200 mg tablettir.

*Komplike olmayan Gonore (bel soğukluğu):*

Günde tek doz 200 mg tablet alınmalıdır.

*Deri ve yumuřak doku enfeksiyonları:* Günde 2 kez 200 mg tablet alınmalıdır.

Doktorunuz PODORA ile tedavinizin ne kadar süreceđini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

**Uygulama yolu ve metodu:**

- Bu ilacı ağızdan bir miktar su ile alınız.
- Bu ilacın emilimini artırmak için yemeklerle birlikte alınız.

**Deđişik yař gruplarında kullanım:**

**Çocuklarda kullanım:**

Çocuklarda (13 yařından küçük) PODORA kullanımı önerilmez.

**Yařlılarda kullanımı:**

Yařlı hastalar için özel bir kullanımı yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek Yetmezliđi:**

Böbrek yetmezliđiniz var ise doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

**Karaciđer Yetmezliđi:**

Karaciđer yetmezliđi için özel bir kullanımı yoktur.

*Eđer PODORA'nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla PODORA kullandıysanız:**

*PODORA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Doz aşımına bađlı olarak mide bulantısı, kusma, mide ekřimesi ve ishal görülebilir.

**PODORA'yı kullanmayı unutursanız:**

Eđer bir dozu atlarsanız endişelenmeyiniz ve bir sonraki doz zamanını bekleyiniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **PODORA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuza danışarak PODORA kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi PODORA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, PODORA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Döküntü, eklem ağrısı, terleme ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme gibi alerjik reaksiyon belirtileri,
- Deride ve/veya dudaklar, gözler, ağız, burun veya genital bölgelerin membranlarında şiddetli kabarma ya da kanama gibi Stevens-Johnson sendromu belirtileri,
- Şiddetli kabartı şeklinde döküntü ve derinin ayrılması gibi toksik epidermal nekroliz belirtileri,
- Ciltte döküntü ya da pembe/kırmızı halkalar şeklinde cilt lezyonları ve kaşıntılı, pullu su kabarcıkları gibi eritema multiforme belirtileri,
- İlacın uzun süre kullanılması sonucu kanda meydana gelen düzensizlik nedeniyle normalden daha kolay enfeksiyon kapma,
- Cilt, göz ve ağızda sararma ve yorgun hissetme gibi şiddetli anemi belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PODORA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Şiddetli ishal.

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Bulantı ya da kusma,
- Karın ağrısı,
- Baş ağrısı,
- Baş dönmesi,
- Kulak çınlaması,
- Yorgunluk, bitkinlik,
- Kaşıntı,
- Karıncalanma ya da uyuşma.

Bunlar PODORA'nın hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması:**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. PODORA'nın Saklanması**

*PODORA'yı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

PODORA'yı 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PODORA'yı kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozulma olmuşsa PODORA'yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat sahibi:*** GENVEON İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

***Üretim yeri*** : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
34580 Silivri – İstanbul

*Bu kullanma talimatı 09/06/2020 tarihinde onaylanmıştır.*