

## KULLANMA TALİMATI

### ORO<sup>®</sup> İHTİYOL % 10 Pomad

Haricen cilde uygulanır.

*Etkin madde:* Her 20 g pomatta 2 g ihtiyol

*Yardımcı Madde (ler):* Susuz lanolin, vazelin

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacımızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında :**

1. **ORO<sup>®</sup> İHTİYOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ORO<sup>®</sup> İHTİYOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ORO<sup>®</sup> İHTİYOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

### **1. ORO<sup>®</sup> İHTİYOL nedir ve ne için kullanılır?**

ORO<sup>®</sup> İHTİYOL 20 g'lık alüminyum tüplerde sunulan, kahverengi renkte bir merhemdir.

ORO<sup>®</sup> İHTİYOL, antiseptik ve dezenfektanlar adı verilen bir gruba dahil olan ihtiyol adlı etkin maddeyi içerir.

ORO<sup>®</sup> İHTİYOL, iltihabi cilt hastalıklarının (egzama, apse, sivilce ve çıban gibi) olgunlaşp, içlerinin temizlenerek tedavi edilmesinde kullanılır.

## 2. ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'un içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise. kullanmayınız.

### ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'u göz ve mukozalara (bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) temas ettirmeyiniz.
- ORO<sup>®</sup> İHTİYOL kullanımı esnasında enfekte bölge sıkılarak ya da bastırarak iltihabı çıkarmaya çalışılmamalıdır.
- ORO<sup>®</sup> İHTİYOL yüksek oranda kükürt içermektedir; kullanımı sırasında idrarda kükürt oranının arttığına dair bazı kayıtlar bulunmaktadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

#### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ORO<sup>®</sup> İHTİYOL hamilelik döneminde dikkatli kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

#### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ORO<sup>®</sup> İHTİYOL kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

### Araç ve makine kullanımı

ORO<sup>®</sup> İHTİYOL'un araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

## **ORO® İHTİYOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ORO® İHTİYOL lanolin (susuz) içermektedir. Lanolin lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, temas dermatit) neden olabilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ORO® İHTİYOL nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

Tedavide en iyi sonuca ulaşmak için ORO® İHTİYOL'ü sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa derinizin hastalıklı bölgesine nazikçe sürünüz. İltihap akmaya başladıktan sonra birkaç gün daha günde bir defa ORO® İHTİYOL Pomad sürülmeye devam edilir.

### **Uygulama yolu ve metodu**

ORO® İHTİYOL rahatsızlığın bulunduğu bölge yıkanıp kurutulduktan sonra günde iki defa yara üzerine sürülüp gazlı bezle kapatılır. Hava almasına engel olmamak için sıkı bandaj kullanılmamalıdır. İltihap akmaya başladıktan sonra birkaç gün daha günde bir defa ORO® İHTİYOL sürülmeye devam edilir. İltihaplı bölge sıkılarak ya da bastırılarak iltihabı çıkarmaya çalışılmamalıdır. Pomad giysilere bulaşabilir ve giysiyi boyayabilir.

### **Değişik yaş grupları**

#### **Çocuklarda kullanım**

18 yaş altı çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanım**

Özel doz ayarlamasına gerek yoktur. Doz ve uygulama şekli yetişkinler ile aynıdır.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek/karaciğer yetmezliği**

ORO® İHTİYOL'un böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına dair bir bilgi yoktur.

*Eğer ORO® İHTİYOL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ORO® İHTİYOL kullandıysanız:**

ORO® İHTİYOL yüksek oranda kükürt içermektedir, gerekenden fazla miktarda kullanıldığında idrarda kükürt oranının arttığına dair bazı kayıtlar bulunmaktadır.

*ORO® İHTİYOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **ORO® İHTİYOL kullanmayı unutursanız:**

Doz uygulanması atlanmamalıdır. Eğer kullanma dozu unutulursa, elden geldiği kadar çabuk giderilmeli ve doz programına devam edilmelidir.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **ORO® İHTİYOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

ORO® İHTİYOL ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ORO® İHTİYOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

- Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
- Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
- Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
- Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın yan etkiler:

- Deride renk değişikliği

Yaygın olmayan yan etkiler:

- Deride tahriş ve şiddetli kaşıntı,
- Aşırı duyarlık reaksiyonları.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5. ORO® İHTİYOL'ün saklanması**

*ORO® İHTİYOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ORO<sup>®</sup> İHTİYOL ü kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bir bozukluk fark ederseniz ORO<sup>®</sup> İHTİYOL ü kullanmayınız

**Ruhsat Sahibi:** ORO İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mimar Sinan Mah. Üsküdar Cad. No:01

Yedpa Tic. Merkezi H2 Caddesi No:177-178

Ataşehir / İSTANBUL

**Üretim yeri:** Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş

Çamlık Mah. Sırn Çelik Bulvarı Ayça Sokak No:6

Taşdelen – Çekmeköy / İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 13.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.*