

## KULLANMA TALİMATI

### PERİMEX PLUS ORAL SPREY

Yalnızca ağız içine uygulanır.

- **Etkin Madde:** %0.15 Benzidamin HCl, %0.12 Klorheksidin diglukonat içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Etil alkol (%96), poloxamer 188, sorbitol (%70), polyoxy 40 hydrogenated castor oil, nane esansı, mentol, boya (CI 45430), deiyonize su içerir.

Her püskürtme 0.15 ml'dir ve 0.180mg Klorheksidin diglukonat ve 0.225 mg Benzidamin HCl içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PERİMEX Plus Oral Sprey nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PERİMEX Plus Oral Sprey'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PERİMEX Plus Oral Sprey nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PERİMEX Plus Oral Sprey'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

#### **1. PERİMEX Plus Oral Sprey nedir ve ne için kullanılır?**

PERİMEX Plus Oral Sprey, 30ml'lik cam şişede ve kutuda bulunur.

PERİMEX Plus Oral Sprey; gingivit, glossit, stomatitis, aphthous stomatitis, periodontal hastalıklar, parodontozlar gibi ağız ve dişeti hastalıkları ile yardımcı tedavi olarak konservatif diş tedavilerinde ve diş çekimi gibi ağız içi operasyonlarından sonra, ayrıca dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak kullanılır.

PERİMEX Plus Oral Sprey; anjin, faranjit, laranjit ve tonsilit gibi boğaz hastalıklarında uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak, ayrıca kemoterapi, radyoterapi veya diğer fiziksel sebeplere (trakeal intubasyon) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde de kullanılır.

## **2. PERİMEX Plus Oral Sprey'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **PERİMEX Plus Oral Sprey'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında
- Gebelikte
- Emzirmede
- 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

### **PERİMEX Plus Oral Sprey'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- Şiddetli karaciğer ve böbrek bozukluğunuz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **PERİMEX Plus Oral Sprey'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

PERİMEX Plus Oral Sprey'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

## **Hamilelik ve Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bu konuda yeterli çalışma olmadığından kullanılmamalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

## **Araç ve makine kullanımı**

PERİMEX Plus Oral Sprey'in araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

## **PERİMEX Plus Oral Sprey'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Veri yoktur.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

- PERİMEX Plus Oral Sprey'de bulunan klorheksidin tuzları yüksek konsantrasyonlarda katyonik ve noniyonik maddelerle kullanıldığında aktivitesi azalabilir.
- Karbonatlarla, boratlarla, benzoatlarla, fosfatlarla, sülfatlarla ve nitratlarla birleştiklerinde çökebilirler.
- Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
- Setrimid ve Lissapol NX gibi surfaktanlarla birleştğinde çözünürlüğü artar.
- Kloramfenikol, formaldehit, çinko sülfat, bakır sülfat, gümüş nitrat, brillant green ve floressein sodyum gibi maddelerle geçimsizdir.
- Nişasta, kitre zamkı, arap zamkı, sodyum aljinat ve karboksi metilselülozla geçimsizdir. Bu maddeler aktiviteyi de azaltır.
- Setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar klorheksidinin aktivitesini de arttırlar.
- Benzidamin HCl ile ilgili etkileşim bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PERİMEX Plus Oral Sprey nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:**

PERİMEX Plus Oral Sprey seyreltilmeden kullanılmalıdır. Kullanımdan sonra ağızdan atılmalıdır.

Yetişkinlerde: PERİMEX Plus Oral Sprey bir defada 4 püskürtme, günde 2-3 kez tekrarlanarak kullanılır. Tedavi süresi ortalama 4-5 gündür. Bu süre içinde olumlu sonuç alınmadığı takdirde hekime danışılmalıdır.

Çocuklarda (6-12 yaş): Genel doz 5 spreydir. Günde 2-3 kez tekrarlanarak kullanılır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

1. Sprey başlığındaki valfi çevirin.
2. İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın.
3. Ağızınızı iyice açın ve sprey deliğini ağızınıza yaklaştırın.
4. İlacı püskürtmek için pompalama düğmesine süratle basın; bu işlemi 4 kez tekrarlayın.
5. Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayın.
6. Klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için önce dişleri fırçalamak uygundur.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Çocuklarda (6-12 yaş): Genel doz 5 spreydir. Günde 2-3 kez tekrarlanarak kullanılır.

##### **Yaşlılarda kullanımı**

Yaşlılarda özel kullanımı yoktur. Yetişkinlerdeki kullanım önerilir.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği**

Benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olanlarda sistemik etki olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

### **Karaciğer yetmezliği**

Benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

*Eğer PERİMEX Plus Oral Sprey'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla PERİMEX Plus Oral Sprey kullandıysanız:**

10 kg ve daha hafif çocuklar 30 ml veya daha fazla PERİMEX Plus Oral Sprey'i kazara içerlerse; konuşma yeteneğinde azalma, sendeleyerek yürüme gibi alkol intoksikasyonu belirtileri görülebilir. Semptomatik tedavi yapılmalıdır ve hasta bir süre izlenmelidir. Gerektiğinde gastrik lavaj uygulanabilir.

*PERİMEX Plus Oral Sprey'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **PERİMEX Plus Oral Sprey'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **PERİMEX Plus Oral Sprey ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır. PERİMEX Plus Oral Sprey'i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

### **4. Olası yan etkiler**

PERİMEX Plus Oral Sprey ağız içinde ve özellikle dişlerde lekelenmeye sebep olabilir. Dil ve ağızda geçici uyuşukluk, yanma ve karıncalanma hissi, tat almada değişiklikler oluşabilir. İlacın biraz sulandırılmasıyla bu etki azalır.

- Bazen bulantı, kusma, ağız kuruluğu, salya ve kalkulus oluşumunda artış olabilir. Nadiren de alerji ve uyku bozukluğu görülebilir.
- Hem periodontit ve hem de gingivitte meydana gelen gingival enflamasyon ve kanama PERİMEX Plus Oral Sprey ile tedaviden sonra periodontit maskelenebilir.

- Benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Sistemik yan etkiler:

Genellikle görülmez ve ciddi değildir. Bunlar; bulantı, kusma, öğürme gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluktur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

##### **5. PERİMEX Plus Oral Sprey 'in saklanması**

PERİMEX Plus Oral Sprey'i *çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PERİMEX Plus Oral Sprey'i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi ve Üretim yeri:** Dentoral Medifarma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Koşuyolu Cad. İbrahimağa Zaviyesi Sok.

No: 55/4 Kadıköy- İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*