

## KULLANMA TALİMATI

**PROVIRON® 25 mg tablet**  
Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 25 mg mesterolon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz, mısır nişastası, povidon (PVP 25000), magnezyum stearat.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **PROVIRON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROVIRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROVIRON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROVIRON'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. PROVIRON nedir ve ne için kullanılır?**

- Her tablet etkin madde olarak, 25 mg mesterolon içerir. Mesterolon, erkeklik hormonu olan androjenler grubuna aittir.
- PROVIRON ambalajında 20 tablet bulunur. Tabletler beyaz renkte olup, tek tarafı çentiklidir.
- PROVIRON, orta ve ileri yaşta görülen erkeklik hormonu eksikliğine bağlı şikayetlerde, cinsel güç bozukluklarında, erkeklik hormonu azlığında, sperm sayısı azlığında kullanılır.

#### **2. PROVIRON 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**PROVIRON 'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eğer;

- Prostat kanserinizi varsa,
- Mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörünüz varsa,
- İlacın içindeki etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

### **PROVIRON'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

PROVIRON sađlıklı kiřilerde kas yapımını veya bedensel iřgücünü arttırmak amacıyla uygulanmamalıdır.

PROVIRON uygulanması esnasında düzenli prostat muayeneleri önerilir.

PROVIRON'un ierdiđine benzer hormonal maddelerin kullanımını sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi karın ii kanamalara sebep olabilecek karaciđer tümörleri gözlemlenmiřtir. řiddetli üst karın ađrısı, karaciđer büyüklüđu veya karın ii kanama belirtileri (karında renk deđiřikliđi, řiřlik) söz konusu olduđunda hemen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin iin geerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

**PROVIRON sadece erkekler iindir.** Kadınlarda kullanılmamalıdır.

#### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımını üzerine etkisi yoktur.

#### **PROVIRON'un ieriđinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Her tablet 60,5 mg laktoz ierir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

#### **Diđer ilalar ile birlikte kullanım**

PROVIRON'un diđer ilalar ile birlikte kullanım üzerine etkisi yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. PROVIRON nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıka:

- Orta ve ileri yařtaki erkeklik hormonu eksikliđine bađlı řikayetler ve cinsel gü bozukluklarında bařlangıta günde 3 defa 1 tablet kullanılır. Tedaviye günde 1-2 defa 1 tablet ile devam edilebilir.
- Erkeklik hormonu azlıđında sürekli tedavi gerekir. Günde 3 defa 1-2 tablet birkaç ay boyunca kullanılır. Daha sonra tedaviye günde 2-3 defa 1 tablet ile devam edilir.
- Sperm sayısını ve kalitesini arttırmak iin 90 gün boyunca günde 2-3 defa 1 tablet kullanılır. Eđer gerekirse birkaç hafta aradan sonra tekrarlanabilir.
- Postpubertal leyding hücre yetmezliđinde birkaç ay boyunca günde 2 defa 1 tablet PROVIRON uygulanır.

Doktorunuz PROVIRON ile tedavinizin ne kadar süreceđini size bildirecektir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Tabletler iđnenmeden ve bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

*Eđer PROVIRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla PROVIRON kullandıysanız:**

Tedavisi için gereken dozun, uygunsuz olarak birçok defa alınmasını takiben bile herhangi bir zehirlenme riski beklenmemektedir.

*PROVIRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**PROVIRON'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, PROVIRON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Sık ve uzun süreli sertleşme

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. PROVIRON'un saklanması**

*PROVIRON 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra PROVIRON'u kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz PROVIRON'u kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad . No:53  
34770 Ümraniye – İSTANBUL  
Tel : 0216 528 36 00  
Faks : 0216 645 39 50

**Üretim yeri:** Bayer Weimar GmbH und. Co. KG, Weimar/Almanya

*Bu kullanma talimatı 28.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.*