

## **KULLANIM KILAVUZU**

### **ÜRÜNÜN ADI**

SalTar LOSYON

### **BİRİM FORMÜLÜ**

1g losyonda; Salisilik asit 20 mg (%2), Katran 8,33 mg (%0,833).

Yardımcı maddeler: Propilenglikol, polikuaterniyum-10, PEG-40 hidrojenize hint yağı, alkol, laktik asit, sodyumlaktat, koku verici, su.

### **TIBBİ ÖZELLİKLERİ**

SalTar Losyon, uygulama kolaylığı sağlaması açısından losyon formunda hazırlanmıştır. Etkin madde olarak Salisilik asit ve Katran içerir.

Salisilik asit deriye uygulandığında kuvvetli keratolitik etki gösterir, bunun yanında zayıf antiseptik, antienflamatuvar, antibakteriyel ve zayıf antifungal etkilere sahiptir.

Katran keratoplastik, antienflamatuvar, zayıf antiseptik ve antipruritik etkiler gösterir.

### **ÖNERİLEN KULLANIM YERİ**

SalTar Losyon, ciltte veya saçlı derideki seboreik dermatit, psoriasis, ekzema gibi kronik dermatozların tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.

### **KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR**

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı hassasiyet gösteren kişilerce kullanılmamalıdır. Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece derinin bütünlüğünün bozulduğu ya da enflamasyonlu bölgelerde kullanılmamalıdır.

### **UYARILAR / ÖNLEMLER**

**HARİCEN KULLANILIR. GÖZLERLE VE MUKOZALARLA TEMASINDAN SAKININIZ.** Katran veya katran türevi maddelere karşı duyarlılık gösteren hastalarca ve salisilat düzeylerinin artmasına neden olabilecek ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan kişilerde uygulama yüzeyi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat toksisitesi göstergeleri (baş dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, iştahın yitilmesi, kulak çınlaması, letarji, yüksek ateş, diyare, psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır. Salisilik asit toksisitesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara verilmelidir. Küçük çocuklarda ve hamilelerde geniş yüzeyli uygulamadan kaçınılmalıdır. Aşırı iltihabi durumlarda irritasyona neden olabileceğinden bu durumlarda ve derideki pullanma sona erdikten sonra kullanılmamalıdır. Katran, güneş ışınlarına duyarlaştırıcı etkiye sahiptir. Güneş ışınlarına maruz kalanlar, solaryum uygulanan kişiler fototerapi (UVA/UVB) uygulanan hastalarda fotosensitiviteye yol açabilir. Uzun süreli kullanımda karsinojenik potansiyeli olabilir bu nedenle uzun süreli tedaviler doktor denetiminde sürdürülmelidir. Saçlı deriye uygulandığında başlangıçta hafif bir yanma hissi oluşabilir fakat bu his çok kısa bir süre sonra ortadan kaybolur. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Katran ve Salisilik asit'in hamilelerde kullanımının fetüse zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı gerektiği takdirde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZU'NU DİKKATLİCE OKUYUNUZ.  
KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ İLAÇ VAR İSE, MUHAKKAK DOKTORUNUZA  
VE ECZACINIZA BİLDİRİNİZ.

### **YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER**

Ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı hassasiyet olduğu takdirde kullanıma ara verip doktorunuza başvurunuz. Ürünün bileşiminde su dışında alkol de mevcut olduğundan, bazen, hafif geçici yanma, kızartı ve deride kuruluk gibi lokal deri iritasyonlarına neden olabilir. İçerdiği katrandan dolayı aşağıda belirtilen yan etkiler de görülebilir:

- Alerjik ve iritatif kontakt dermatite neden olabilir,
- Follikülit yapabilir,
- Fotosensitiviteye neden olabilir,
- Deri, saç ve giysilerde boyama yapabilir.

İSTENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ ZAMAN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE  
FARMAKOVİJİLAN MERKEZİNE (TUFAM) BİLDİRİNİZ.

### **İLAÇ ETKİLEŞMELERİ**

Çok geniş yüzeylere uzun süreli uygulamalarda, özellikle kapalı bandaj tekniği ile uygulandığında Salisilik asidin çeşitli ilaçlarla etkileşecek oranda absorbe olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Katran'ın herhangi bir ilaçla etkileşimi tespit edilmemiştir. Ancak Katran'ın, güneş ışınlarına duyarlaştırıcı etkisi olması nedeniyle güneş ışınlarına duyarlılığı artıran psoralen, tetrasiklinler ve tretinoin ile birlikte kullanılmamalıdır.

### **GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

Dermatologların tavsiyesi göz önüne alınmalıdır.  
Aksi belirtilmedikçe ;

- **Cilt üzerine** : Doktor önerisine göre günde 1 ila 2 kez ince bir tabaka halinde uygulanır.

- **Saçlı deride** : Saçlar ıslatılıp, bir miktar losyon avuca alınıp saçlara friksiyon yapılır. 5 dakika kadar sonra saçlar ılık veya sıcak su ile iyice çalkalanır. Gerektiği takdirde sabun ihtiva etmeyen yumuşak bir şampuan kullanılabilir. Doktor tarafından, ilacın saçlarla daha uzun süreyle temasta kalması önerilirse, SalTar losyon saçlara uygulandıktan sonra, saçlar taranıp bırakılır ve doktorun önerdiği süre sonunda ilaç yukarıda belirtilmiş olduğu gibi saçlardan arındırılır. Ürün su dışında, alkol de ihtiva ettiğinden, uygulandıktan hemen sonra, saçlı deride hafif bir yanma hissi oluşturabilir, fakat bu his, çok kısa bir süre sonra ortadan kaybolur. Genelde haftada 1 - 2 uygulama yeterli olur, bunun dışında doktor önerisine göre kullanılmalıdır.

### **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

Kutuda; polietilen damlalıklı tıpa ve pilfer-proof kapaklı polietilen şişede 30g; polietilen tıpa ve pilfer-proof kapaklı polipropilen şişede 30g.

### **İZİN SAHİBİ**

**SEZA** Kim. ve Tıb. Mal. ve İlaç Sat. ve Dağ. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi/İZMİR

**SEZA**  
**SALTAR LOSYON, 30g**

**Kullanım Kılavuzu**

**İMAL YERİ**

ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi / İZMİR  
İzin Tarihi-No: 26.02.2009 - 2009/14

HARİCEN KULLANILIR. Gözle temasından sakınınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.**