

**adant**<sup>®</sup>  
Sodyum hyaluronat



**ÜRÜN TANIMI:** Adant<sup>®</sup> 25 mg/2.5 mL kullanıma hazır şırınga etkin madde olarak 1 mL'de 10 mg sodyum hyaluronat içerir.

**ENDİKASYONLARI:** Diz osteoartriti, ağrılı omuz, Sınıf I, II, III trapezoid-metakarpal osteoartriti, diğer sinoviyal eklemlerin dejeneratif ve travmatik değişikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ağrı ve hareketin kısıtlanması.

**DOZAJ VE UYGULAMA:** Birer hafta arayla yapılan 3 enjeksiyon vakaların büyük çoğunluğunda semptomları giderir. 3 enjeksiyon ile yanıt alınamayan vakalarda 5 haftaya kadar uygulama yapılabilir. Aynı anda birden fazla ekleme (çift diz-omuz-ayak bileği gibi) uygulama yapılabilir. Uygulama diz eklemi, omuz eklemi, trapezoid- metakarpal eklem veya diğer etkilenen sinoviyal eklemde yapılmalıdır. **Trapezoid-metakarpal eklem osteoartriti:** Osteoartritin derecesine bağlı olarak önerilen iki uygulama tekniği bulunmaktadır: Evre I rizoartrozda lateral eksternal yoldan, Evre II ve Evre III rizoartrozda etkilenen parmaklar arası ilk eklem noktasından uygulama yapılmalıdır. Bu uygulamanın endoskopik görüntüleme eşliğinde yapılması uygulama kolaylığı sağlayacaktır.

**KONTRENDİKASYONLARI:** Geçmişinde ürüne aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

**YAN ETKİLER:** Bazı hastalarda ürtiker ve prurit gibi cilt reaksiyonları görülebilir. Bu durumda uygulama kesilir ve hasta uygun şekilde tedavi edilir. Nadiren enjeksiyon yerinde ağrı (uygulamadan sonra geçici ağrı) ve şişme bildirilmiştir. Seyrek olarak enjeksiyon yerinde hidrops, kızarma, sıcaklık hissi ve ağırlık gibi hasta şikayetleri görülmüştür. Çok ender olarak şok görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumda tedavi kesilir ve hasta yakın gözetim altına alınarak gerekli tedavi uygulanır.

**UYARILAR VE ÖNLEMLER:** İntra-artiküler bölgeye enjekte edildiğinden tüm enjeksiyon işlemleri steril koşullarda yapılmalıdır. Eklem sıvısında az miktarda retansiyon görülse bile artrosentez ile alınmalıdır. Enjeksiyonun damara yapılmamasına dikkat edilmelidir. Gözlere tatbik edilmemelidir. Ürünün viskozitesi nedeniyle 22-23 G iğne ile enjekte edilmelidir. Ürün açıldıktan sonra hemen ve tek seferde kullanılmalıdır. Kalan ürün atılmalıdır. Eklem iltihabı olan diz osteoartriti hastalarda lokal enflamasyonu kötüleştirir. Bu nedenle lokal semptomlar hafifledikten sonra uygulanması önerilir. Uygulamadan sonra nadiren lokal ağrı görülebilir. Ağrı görülmesini önlemek için enjeksiyondan sonra bölge hareketsiz tutulmalıdır. Tam olarak intra-artiküler boşluğa enjekte edilmelidir. Aksi durumda ağrıya neden olabilir.

**ETKİLEŞİMLER VE GEÇİMSİZLİKLER:** Üründe çökme görülebileceğinden benzalkonyum klorür içeren, klorheksidinli ya da kuaterner amonyum tuzları gibi dezenfektanlarla temas ettirilmemelidir.

**SAKLAMA KOŞULLARI:** 1°C ila 30°C arasında muhafaza ediniz. Bu sıcaklık sağlanamıyorsa buzdolabında saklayınız. Ürün buzdolabında saklandığında kullanılmadan önce oda sıcaklığında 20 ya da 30 dakika bekletiniz.

**TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:** 1 şırınga içeren ambalaj içerisinde, 1 adet 22G iğne ile birlikte kullanıma hazır şırınga (2.5 ml'lik şırınga 25 mg sodyum hyaluronat içerir).

**CE 0318 CE SERTİFİKA YILI:** 2011.

**İTHALATÇI FİRMA:** Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Levazım Mah. Kuru Sk. No: 2 Zorlu Center D-Blok T3 Katı D: 344, 34340 Beşiktaş - İstanbul.

**ÜRETİCİ FİRMA:** Tedec Meiji Farma S.A. Ctra.M 300 Km. 30, 500 28802 Alcalá de Henares Madrid- İspanya.

**KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI:** 136,00 TL (01 Ekim 2015).

**BASIM/GÜNCELLEME TARİHİ:** 13.11.2015.

**REÇETE İLE SATILIR.**

Adant 25 mg / 2.5 mL şırınga ilaç değildir. EEC / 2007 / 47 direktifine uygun CE belgeli tıbbi cihaz statüsünde ruhsatlandırılmıştır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

**ER-KİM**  
İ L A Ç