

KULLANIM KILAVUZU

BATİODİN GARGARA

Bileşimi:

% 10 (a/h) serbest iyod içeren Polivinil Pirolidon İyot kompleksi'nin %7,5 oranında sudaki çözeltisidir.

Yardımcı Maddeler:

Gliserin, etanol, sodyum sakarin ve koku verici olarak nane esansı içerir.

Tıbbi Özellikleri:

BATİODİN GARGARA, geniş spektrumlu mikrobisit , bakterisid, virüs id, fungusit etkisi olan bir antiseptik üründür. Ağız ve boğaz, mukoza enfeksiyonlarında rahatlıkla kullanılabilir. Antiseptik etkisi bünyesinde mevcut bulunan iyottan gelmektedir. İyot, kompleksten yavaş ve tedricen serbest kalarak bu etkiyi sağlar.

BATİODİN GARGARA ' da iyot eser miktarda da olsa ağız mukozasından emilebilir, idrar yoluyla vücuttan atılır. İyoda duyarlı kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Önerilen Kullanım Yeri :

Ağız ve boğaz mukozası, ayrıca diş eti enfeksiyon hastalıkları (faranjit , stomatit afr, pamukçuk , gingivit ve herpetik ülser) tedavisinde kullanılır. Ağız ve boğaz boşluğundaki ameliyatlardan önce ve sonra endikedir. Genel boğaz hijyeni tedavisinde kullanılır.

Kullanılmaması Gereken Durumlar:

3. ayından itibaren hamilelerin ve süt emziren kadınların doktor kontrolü altında kullanılması gerekir. Manifest hipertirod ve nontoksik nodüler guatr'da özellikle dekompoze kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:

BATİODİN GARGARA yutulmamalıdır. Yanlışlıkla yutulduğunda, gastro intestinal yolda iyod korosif etki yapar. Ağızda madeni tad bırakır.. Kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir. Semptomatik bir tedavi yapılmak üzere mide boşaltılır. % 5'lik nişasta musilajı veya %1'lik sodyum tiyosülfat ile mide lavajı yapılır. Sodyum tiyosulfat iyodu iyodüre indirgeyerek inaktif hale sokar.

Göze tatbik edilmez. Hipertiroid hastaların ve memedeki çocukların tiroid fonksiyonu gözlenmelidir. 2,5-5 yaş arası çocuklarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç varsa muhakkak doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz

Yan etkiler / advers etkiler:

İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyon görülebilir. İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) 'ne bildiriniz.

İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler:

Organik materyaller (protein,serum,kan vb) BATİODİN GARGARA'daki iyodun antiseptik etkisini azaltır. Civa bileşiği ile geçimsizdir.

Günlük kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse :

- Tedavide kullanım için : Yarım bardak suya 1-2 çay kaşığı BATİODİN GARGARA katılır ve 30 saniye gargara yapılır.Hastalık belirtileri kayboluncaya kadar 1-4 saatte bir kullanılabilir.
- Günlük ağız hijyeni için : Yarım bardak suya bir çay kaşığı BATİODİN GARGARA katılır, birkaç saniye gargara yapılır.
- BATİODİN GARGARA acıtmaz , tahriş etmez, leke burakmaz, yıkamakla kolay temizlenir.

Ticari takdim şekli:

100 ml ve 200 ml lik, plastik kapaklı cam şişede ve kutuda.

İzin sahibi ve adresi:

ORO İlaçları Ltd. Şti.

Yeni Çamlıca Mah.Yedpa Tic.Merk.H-2 Cad. No:73

Ümraniye-İstanbul

Üretici isim ve adresi:

Merkez Laboratuvarı İlaç San.ve Tic.A.Ş

Çamlık Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok.No:4

Taşdelen – Ümraniye / İstanbul

Saklama koşulları:

25° C' nin altında, oda sıcaklığında , çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde ambalajında saklayınız.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.