

## KULLANIM KILAVUZU

### Ürünün adı:

Dulcaryl Efervesan Tablet (1/4 DOZ)

### Birim formülü

Her efervesan tablet; 3.125 mg Sodyum Sakkarin.2H<sub>2</sub>O ve 31.250 mg Sodyum Siklamat etken madde içerir. Ayrıca sodyum bikarbonat, tartarik asit ve sodyum karboksimetil selüloz içerir.

### Tıbbi özellikleri

Sodyum siklamat ile sodyum sakkarin gibi iki sentetik tatlandırıcının bileşiminden oluşur. Sıcak ve soğuk sıvılarda kolaylıkla erir ve kaynatılmakla etkisini kaybetmez.

Sodyum siklamat şeker tadı veren sentetik bir maddedir. Şekere göre 30 kat daha tatlıdır.

Sakkarin de şeker tadı veren sentetik bir maddedir. Şekere göre 300 kat daha tatlıdır. Ancak tek başına kullanıldığında, sonradan ağızda madensel ve acı bir tad bırakır. Oysa ki siklamat ile 1/10 oranında karıştırılırsa, bu sakıncası büyük ölçüde ortadan kalkar. Dulcaryl'de sodyum siklamat ile sodyum sakkarin'in bir araya getirilmesinin nedeni budur.

Diğer yandan, Dulcaryl (1/4 doz) tabletleri efervesan olduklarından, sıvılarda çözülme yetenekleri tam ve hızlıdır, çökelti yapmaz.

### Önerilen kullanım yeri

Dulcaryl (1/4 doz) tablet, şeker almaları sakıncalı olan hastaların besinlerini tatlılaştırmak için kullanabilecekleri bir üründür.

### Kullanılmaması gereken durumlar:

Dulcaryl siklamat ve sakkarine karşı alerjisi olanlarda, akut böbrek yetmezliği ve akut kalp yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

### Uyarılar / Önlemler:

Konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve karaciğer sirozu gibi su ve tuz retansiyonu olan ve tuzsuz rejim uygulayanlarda dikkatle kullanılmalı ve içeriğindeki sodyum miktarı dikkate alınmalıdır. 1 tablet Dulcaryl (1/4 doz) 3.869 mg sodyum içerir.

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

### **Yan etkiler/Advers etkiler**

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

Kimi kişilerde fotosensibilite, duyarlılık, dışkı yumuşaklığı, ishal yapabilir.

**BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.**

### **İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler:**

Dulcaryl, oral linkomisin preparatları ile beraber kullanılmamalıdır. Linkomisin absorpsiyonunu azaltabilir.

Diüretiklerle beraber kullanıldığında içindeki sodyum nedeniyle yüksek dozda alındığında Dulcaryl'in diüretik etkiyi azaltabileceği dikkate alınmalıdır.

### **Günlük kullanım şekli ve dozu:**

2 Tablet Dulcaryl (1/4 doz) 1 tatlı kaşığı toz şekeri ya da 1 küp kesme şekerin sağladığı tatlılığı sağlar; bu eşdeğerlilik göz önünde tutularak miktar saptanır. Dulcaryl çözeltisi kaynatılmakla bozulmaz.

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından (1982) sodyum siklamat için kabul edilen günlük tüketim miktarı vücut ağırlığının kg'ı başına 0-12 mg'dır. Sodyum sakkarin için ise bu sınır 2.5-5 mg/kg'dır. Bu nedenle tablet olarak kullanıldığında sodyum siklamat'ın günlük dozu kg başına 12 mg'ı, sodyum sakkarin'in günlük dozu ise kg başına 2.5-5 mg'ı aşmamalıdır.

### **Ticari takdim şekli:**

100, 300, 500 ve 1000 tabletlik otomatik dozajlı ambalajlarda.

### **İzin sahibi:**

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

34398 Maslak-İSTANBUL

### **Üretim yeri:**

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.