

KULLANMA TALİMATI

HİPPURİN 1 g Film Tablet

Ağız yoluyla kullanım içindir.

- **Etkin maddeler:** Her tablet 1 g metenamin hippurat içermektedir.
- **Yardımcı madde(ler):** Mikrokristalin selüloz, Polivinilpirolidon (PVP), Magnezyum stearat, mannitol
Film kaplama maddeleri: Hidroksipropil metilselüloz, Polietilen glikol 4000, Titanyum dioksit, Talk, Etanol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma Talimatında:

1. **HİPPURİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **HİPPURİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **HİPPURİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **HİPPURİN' in saklanması**

1. HİPPURİN nedir ve ne için kullanılır?

- HİPPURİN tabletler; beyaz renkli, oblong, iki yüzü çentikli, film tabletlerdir.
- HİPPURİN 28 ve 56 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
- HİPPURİN' in etkin maddesi olan metenamin hippurat antibakteriyel bir maddedir.
- HİPPURİN alındığında idrarın asit ortamında, metenamin hippuratın bileşiminde bulunan metenamin parçalanarak antibakteriyel bir madde olan formaldehit meydana getirir. Formaldehit bakterileri tahrip eder ya da büyümelerine engel olur.
- Metenamin hippuratın bileşiminde bulunan hippurik asit ise idrarı asitlendirmeye (HİPPURİN idrar asidik olduğunda etki gösterir) yardım ettiği gibi zayıf bir bakteriyostatik (bakterilerin çoğalmasını engelleyici) etkiye de sahiptir.

HİPPURİN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Uzun süreli tedavi gerektiren idrar yolu enfeksiyonları (ör: piyelonefrit, sistit, piyelit) ile beraber oluşan bakteriüride (idrarda bakterilerin bulunması) tedavi edici ve koruyucu olarak,
- Akut idrar yolu enfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun bir antibiyotikle kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak (Akut idrar yolu enfeksiyonlarında tek başına kullanılmamalıdır),
- Sistit (mesane iltihabı) ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane gibi) uzun süreli tedavi için,
- Mesanesine sonda taktılı olan hastalarda bakterisit (bakteri öldürücü) etki sağlamak amacı ile.

2. HİPPURİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HİPPURİN' i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Metenamin hippurat ya da ilacın içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (HİPPURİN' in bileşiminde yer alan maddeler kullanma talimatının başında verilmektedir, eğer sizde böyle bir durum var ise HİPPURİN kullanmaya başlamadan önce sizi tedavi eden doktorunuza bildiriniz),
- Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
- Böbrek hastalığınız varsa (doktorunuz HİPPURİN kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir, doktorunuzun onayı olmadan kullanmayınız),
- Metabolik asidoz (vücuttaki asit miktarının artması) durumunda,
- Vücudunuzda ciddi su kaybı söz konusu ise
- Gut hastalığınız varsa

HİPPURİN' i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- HİPPURİN' i çok yüksek dozlarda kullanırsanız, idrar keseniz tahriş olabilir, ağrılı ve sık idrara çıkmanız söz konusu olabilir, idrarınızda albümin (albüminüri) ve kanama görülebilir.
- Doktorunuz idrarınızı bazık yapacak yiyecek ve içecekleri kullanmamanızı önerebilir, idrarınızın asitliğini artırıcı ilaçlar verebilir (HİPPURİN' in etki gösterebilmesi için idrarınızın asidik olması gerekmektedir.)
- Doktorunuz bazı durumlarda idrarınızın asit pH' da olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.
- Doktorunuz bazı durumlarda, özellikle karaciğer bozukluğunuz var ise periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmasını tavsiye edebilir.

HİPPURİN' in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HİPPURİN' i yemeklerden sonra kullanınız.

HİPPURİN kullanırken idrarınızı bazikleştirecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmanız gerekebilir. Hangi yiyecek ve içeceklerden uzak duracağınız konusunda doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelikte HİPPURİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz bir değerlendirme yapıp, ilacı ya da emzirmeyi kesmenizi önerebilir.

Araç ve makine kullanımı

HİPPURİN' in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

- İdrarı bazikleştiren ilaçlar (ör: sodyum ya da kalsiyum içeren antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sitratlar ya da sodyum bikarbonat gibi),
- Tiazid diüretikleri,
- Sülfonamidler (ör: sülfametizol, sülfatiazin gibi)

Laboratuvar testleri ile etkileşim: HİPPURİN, yaptırdığımız bazı laboratuvar testlerinin hatalı sonuçlar vermesine neden olabilir. HİPPURİN kullanımınız esnasında bir laboratuvar testi yaptıracaksanız, HİPPURİN kullandığınızı doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HİPPURİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun size önerdiği dozu kullanınız.

- HİPPURİN' in yetişkinler için kullanım dozu sabah – akşam, yemeklerden sonra 1' er tablet şeklindedir.
- Sonda takılan hastalarda günlük kullanım dozu günde 3 defa 1 tablete çıkabilir.
- Günde 4 tablettten fazla kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

- HİPPURİN ağız yoluyla kullanım içindir.
- Tabletler bölünebilir ya da hastanın tercihine göre bir bardak meyve suyu ya da süt ile birlikte alınabilir.

Değişik yaş grupları:

- **Çocuklarda kullanımı:**

HİPPURİN' in 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

6 – 12 yaş arası çocuklarda kullanım dozu, doktorunuzun tavsiyesine göre sabah – akşam, yemeklerden sonra yarım veya 1 tablet şeklindedir.

12 yaşından büyük çocuklara yetişkinlerle aynı doz uygulanır.

- **Yaşlılarda kullanımı:**

Doktorunuz karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonlarınızda olası azalmaları, eş zamanlı hastalıkları ve kullandığınız diğer ilaçları dikkate alarak en düşük tedavi dozu ile tedavinize başlayabilir.

Özel kullanım durumları:

- **Böbrek/karaciğer yetmezliği**

Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda HİPPURİN kullanılmamalıdır.

Eğer HİPPURİN' in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HİPPURİN kullandıysanız:

HİPPURİN' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız hemen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz veya en yakın hastaneye başvurunuz.

HİPPURİN' i kullanmayı unutursanız:

Unutulan doz hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır, ancak bir sonraki doza yakın zamanda hatırlanırsa dozu atlayın, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HİPPURİN ile tedaviniz sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

HİPPURİN ile tedaviniz sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HİPPURİN' in bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HİPPURİN' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HİPPURİN' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:
Çok yaygın ($\geq 1/10$); yaygın ($\geq 1/100$ ila $\leq 1/10$); yaygın olmayan ($\geq 1/1.000$ ila $\leq 1/100$); seyrek ($\geq 1/10.000$ ila $\leq 1/1.000$); çok seyrek ($\leq 1/10.000$); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

- Bulantı,
- Hazımsızlık,

- Güçl kle ya da ađrılı bir Őekilde idrar yapma (dis ri),
- Ciltte d k nt  ve kaŐıntı (raŐ),
- İdrar kesesi iritasyonu.

Bunlar HİPPURİN' in hafif yan etkileridir.

İdrar kesesi iritasyonu yaygın olmamakla birlikte diđer yan etkiler yaygın olarak g r lebilir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi geemeyen herhangi bir yan etki ile karŐılaŐırsanız, doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. HİPPURİN' in saklanması

HİPPURİN' i çocukların g remeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız. Nemden ve direkt g neŐ ıŐığından koruyarak, 30  C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın  zerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra HİPPURİN' i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ő.
Dođan Araslı Cad. No. 219 Esenyurt / İSTANBUL

 retici Firma:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ő.
Dođan Araslı Cad. No. 219 Esenyurt / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı . . . tarihinde onaylanmıŐtır.