

incelenmemiştir.

Eğer N-CORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza iletin.

**Kullanmanız gerekenden fazla N-CORT kullanırsanız:**  
İlacınızı içerdiği aktif maddenin miktarı dikkate alındığında akut doz aşımı beklenmez. N-CORT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

**N-CORT'u kullanmayı unutursanız:**  
Bir dozu atarsanız ve sonraki dozun saati çok yakın değilse, hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

**N-CORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

N-CORT tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, alerjik şikayetleriniz yeniden başlayabilir.

**4- Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, N-CORT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, N-CORT'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**  
• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (nefes almada güçlük, boğazda şişme)

• Göz kapakları, ağız gevresi el ve ayaklarda kaşıntıyla beraber ciltte yaygın şişme olması  
• Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin N-CORT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

• Katarakt  
• Glukom  
• Göz içi basıncında artma  
• Burun kanaması  
• Okstürük  
• Bronşlarda iltihaplanma (bronşit)  
• Dişlerle ilgili bozukluklar  
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

• Burun ve boğaz mukozasının kuruması, burun tıkanıklığı ve hapşırma  
• Burun içi mukozanın iltihaplanması (rinit)  
• Yutak iltihabı (Farenjit)  
• Soğuk algınlığı sendromu  
• Baş ağrısı  
• Baş dönmesi  
• Halsizlik  
• Nefes darlığı  
• Uykusuzluk

• Hazımsızlık, karın ağrısı  
• Tad ve koku değişikliği, mide bulantısı  
• Yutak ve gırtlakta ağrı  
• İshal  
• Deride pul pul dökülmeler  
Bunlar N-CORT'un hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.  
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

**5- N-CORT'un saklanması**

N-CORT'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve orijinal ambalajında saklayınız. N-CORT'u, kapağını açtıktan 2 ay sonra atınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**  
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra N-CORT'u kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:**

BERKO İLAÇ ve KİMYA SANAYİ A.Ş.  
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16  
Ataşehir / İstanbul  
0216 456 65 70 (Pbx)  
0216 456 65 79 (Faks)  
info@berko.com.tr

**Üretim Yeri:**

DENTORAL MEDİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ  
Koşuyolu Cad. İbrahimpaşa Zaviyesi Sk. No: 55/4 Kadıköy/İstanbul

Bu kullanma talimatı 06/05/2013 tarihinde onaylanmıştır.

## KULLANMA TALİMATI

### N-CORT %0.055 NAZAL SPREY

**Haricen kullanılır.**  
**Burun içine püskürtülerek kullanılır.**

**Etken madde:** (%w/w)  
Triamsinolon asetonid 0,055

**Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum klorür %50, Sodyum hidroksit, Hidroklorik asit, EDTA disodyum, Polisorbat 80, Avicel RC 591, Dekstroz monohidrat, Deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.  
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.  
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.  
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.**

**Bu Kullanma Talimatında:**

**1- N-CORT nedir ve ne için kullanılır?**

**2- N-CORT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**3- N-CORT nasıl kullanılır?**

**4- Olası yan etkiler nelerdir?**

**5- N-CORT'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

**1- N-CORT nedir ve ne için kullanılır?**

N-CORT, triamsinolon asetonid etkin maddesini içerir. Her püskürtme dozunda 55 mikrogram triamsinolon asetonid içeren ölçülü doz kapağı + nazal adaptörden oluşan ambalajda kullanıma sunulmuştur. N-CORT antialerjik bir kortikosteroiddir. Bu ilaç mevsimsel ve yıl boyu devam eden alerjik nezlede 2 yaşın üzeri çocuk ve yetişkinlerde kullanılır.

glukom veya katarakt gibi gözle ilgili sorunlarınız olduysa (Kortikosteroidlerin bu gibi göz sorunlarına yol açtığı rapor edilmiştir. Doktorunuz düzenli aralıklarla göz muayenesi yaparak sizi yakından takip edecektir.) Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

**N-CORT'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:**  
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

**Hamilelik:**

• **İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.**  
• Hamileyken N-CORT Nazal Sprey'i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlamadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.  
• Doktorunuz anneyle sağlayacağı yararın, fetusa verebileceği potansiyel zarardan daha fazla olduğuna hükmederse, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir.  
• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

**Emzirme:**

• **İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.**  
• Emzirme sırasında N-CORT Nazal Sprey ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği site geçebilecek ilaçtan korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

**Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımına bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

**N-CORT'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

N-CORT'un içinde yardımcı madde olarak benzalkonyum klorür bulunur. Bu madde iritandır, deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**  
N-CORT'un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğu dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza

veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

**3- N-CORT nasıl kullanılır?**

**Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**  
Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

**Yetişkinlerde, 12 yaş ve üzerindeki kişiler için:**

Başlangıç dozu olarak her gün bir kez, her burun deliğimize 2 püskürtme şeklinde 220 mikrogram uygulayınız. Belirtiler kontrol altına alınca, günde bir kez, her burun deliğine bir püskürtme şeklinde 110 mikrogramla devam ediniz.

Bazı hastalarda tedavinin ilk günlerinde belirtilerde iyileşme görülebilir. Ancak en yüksek yararın elde edilebilmesi için birkaç günlük tedaviye ihtiyaç duyulabilir

**6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için:**

Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Daha şiddetli belirtiler varsa 220 mikrogramlık doz kullanılabilir.

Belirtiler kontrol altına alınca tedaviye en düşük etkili doz ile devam edilmelidir.

**v2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için:**

Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Bu yaş grubunda uygulanacak günlük en yüksek doz da 110 mikrogramdır.

**2 yaşından küçük çocuklar için:**

İlacın bu yaşta çocuklarda etkili ve güvenli olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklar için kullanımı önerilmemektedir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

N-CORT sadece burun yoluyla alınır ve en uygun etkinin elde edilmesi için düzenli olarak kullanılması gerekir.

**N-CORT'un uygulanması:**

N-CORT sadece burun içine püskürtülerek kullanılır.

1- Beyaz renkli kapağı yukarı doğru iterek çıkarınız. Mavi renkli klipsi de

yana doğru çekerek çıkarınız. Kullanmadan önce şişeyi yavaşça çalkalayınız.



2. Nazal Spreyi ilk defa kullanmadan önce şişeyi dik tutunuz ve baş kısmını aşağıya doğru bastırarak pompayı doldurunuz ve ince bir sprey elde edene kadar 5 defa püskürtme yapınız. Sprey kullanıma hazırdır.



3. Burun deliklerinizden birini parmağınızla bastırarak kapatınız. Şişeyi dik tutunuz ve baş kısmını size rahatsız etmeyecek seviyeye kadar burun deliğinizin içine sokunuz. Ağzınız kapalı iken ve burnunuzdan hafifçe nefes alırken şişenin baş kısmına basarak bir püskürtme yapınız.



4. Ağzınızdan nefes veriniz.

5. Yukarıdaki 3. ve 4. madde yazılı olan işlemleri diğer burun deliğimize uygulayınız.

6. 12 yaşında veya üstüdeyseniz, her bir burun deliğine 2 püskürtme dozu verebilmeniz için yukarıda yazılı 3, 4, ve 5. maddelerde yazılı işlemleri bir kez daha tekrarlayınız.

En iyi etkiyi elde edebilmek için, ürünü düzenli olarak kullanmanız gerekir.

7. **Spreyi kullandıktan sonra:** Yumuşak bir bez veya mendille başlığı dikkatlice siliniz ve toz kapağını takınız.

Eğer nazal spreyi 2 haftadan daha uzun süre için kullanmadıysanız, yeniden kullanmaya başlamadan önce bir defa havaya püskürtme yapmanız gerekir.

Bu uygulama sırasında başlığın püskürtme noktasını kendinizden uzak tutunuz.

Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Eğer sprey çalışmazsa, tıkanmış olabilir; aşağıdaki şekilde temizleyiniz. Tıkanıklığı açmaya çalışmayınız. İğne veya sert bir nesne ile ufak sprey deliğini genişletmeye çalışmayınız, çünkü sprey mekanizması bozulabilir.

Nazal sprey haftada en az bir kere veya tıkanırsa daha sık temizlenmelidir.

**SPREYİN TEMİZLENMESİ**

1. Toz kapağını ve şekilde gösterilen sadece sprey başlığını çıkarınız. kapağını ve sprey başlığını birkaç dakika sıcak suda ıslatınız, daha sonra soğuk akan musluk suyunu durulayınız.



3. Sallayarak veya hafifçe vurarak, fazla suyu uzaklaştırınız ve kurumaya bırakınız. 4. Sprey başlığını tekrar takınız.

5. İnce sprey gelinceye kadar üniteyi püskürtünüz ve normal biçimde kullanınız. İlk uygulamadan başlamak üzere, 120 püskürtmeden sonra veya 2 ay içinde (13.5 g/ambalaj) şişenin atılması gerekir.

Kullanım sonrası arta kalan süspansiyon başka bir şişeye aktarılmamalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz N-CORT ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü şikayetleriniz yeniden başlayabilir.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:**

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için: Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Daha şiddetli belirtiler varsa 220 mikrogramlık doz kullanılabilir. Belirtiler kontrol altına alınca tedaviye en düşük etkili doz ile devam edilmelidir.

2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için: Günde bir kez, her burun deliğine 1 püskürtme şeklinde 110 mikrogramdır. Bu yaş grubunda uygulanacak günlük en yüksek doz da 110 mikrogramdır.

2 yaşından küçük çocuklar için: İlacın bu yaşta çocuklarda etkili ve güvenli olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocuklar için kullanımı önerilmemektedir.

**Yaşlılarda Kullanım:**

N-CORT'un yaşlı hastalardaki güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

N-CORT'un böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği