

KULLANMA TALİMATI

PROVIRON® 25 mg tablet
Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 25 mg mesterolon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz, mısır nişastası, povidon (PVP 25000), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **PROVIRON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **PROVIRON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **PROVIRON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **PROVIRON'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. PROVIRON nedir ve ne için kullanılır?

- Her tablet etkin madde olarak, 25 mg mesterolon içerir. Mesterolon, erkeklik hormonu olan androjenler grubuna aittir.
- PROVIRON ambalajında 20 tablet bulunur. Tabletler beyaz renkte olup, tek tarafı çentiklidir.
- PROVIRON, orta ve ileri yaşta görülen erkeklik hormonu eksikliğine bağlı şikayetlerde, cinsel güç bozukluklarında, erkeklik hormonu azlığında, sperm sayısı azlığında kullanılır.

2. PROVIRON 'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PROVIRON 'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

- Prostat kanserinizi varsa,
- Mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörünüz varsa,
- İlacın içindeki etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz varsa

PROVIRON'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

PROVIRON sađlıklı kiřilerde kas yapımını veya bedensel iřgücünü arttırmak amacıyla uygulanmamalıdır.

PROVIRON uygulanması esnasında düzenli prostat muayeneleri önerilir.

PROVIRON'un içerdiđine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi karın içi kanamalara sebep olabilecek karaciđer tümörleri gözlemlenmiřtir. řiddetli üst karın ađrısı, karaciđer büyüklüğü veya karın içi kanama belirtileri (karında renk deđiřikliđi, řiřlik) söz konusu olduđunda hemen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

PROVIRON sadece erkekler içindir. Kadınlarda kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

PROVIRON'un içeriđinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her tablet 60,5 mg laktoz içerir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanım

PROVIRON'un diđer ilaçlar ile birlikte kullanım üzerine etkisi yoktur.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PROVIRON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:

- Orta ve ileri yařtaki erkeklik horonu eksikliđine bađlı řikayetler ve cinsel güç bozukluklarında bařlangıçta günde 3 defa 1 tablet kullanılır. Tedaviye günde 1-2 defa 1 tablet ile devam edilebilir.
- Erkeklik hormonu azlığında sürekli tedavi gerekir. Günde 3 defa 1-2 tablet birkaç ay boyunca kullanılır. Daha sonra tedaviye günde 2-3 defa 1 tablet ile devam edilir.
- Sperm sayısını ve kalitesini arttırmak için 90 gün boyunca günde 2-3 defa 1 tablet kullanılır. Eđer gerekirse birkaç hafta aradan sonra tekrarlanabilir.
- Postpubertal leyding hücre yetmezliğinde birkaç ay boyunca günde 2 defa 1 tablet PROVIRON uygulanır.

Doktorunuz PROVIRON ile tedavinizin ne kadar süreceđini size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiđnenmeden ve bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

Eđer PROVIRON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduđuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PROVIRON kullandıysanız:

Tedavisi için gereken dozun, uygunsuz olarak birçok defa alınmasını takiben bile herhangi bir zehirlenme riski beklenmemektedir.

PROVIRON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PROVIRON'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, PROVIRON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Sık ve uzun süreli sertleşme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PROVIRON'un saklanması

PROVIRON 'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra PROVIRON'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz PROVIRON'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad . No:53
34770 Ümraniye – İSTANBUL
Tel : 0216 528 36 00
Faks : 0216 645 39 50

Üretim yeri: Bayer Türk Kimya San. ve Ltd. Şti. Topkapı/ İstanbul

Bu kullanma talimatı 29.03.2013 tarihinde onaylanmıştır.